

Traitement post-opératoire après une érosion

À LA MAISON

- L'œil est **sensible** les 3 à 4 premiers jours. En cas de douleur, vous pouvez prendre 1 comprimé de Dafalgan® (500 mg) toutes les 6 heures. Si nécessaire, Ibuprofen® (400 mg) toutes les 8 heures.
- Si on vous a mis un pansement, vous pouvez l'enlever le matin après l'opération. Commencez à mettre des gouttes dès le retrait du pansement et suivez la prescription/le calendrier du médecin.
- L'œil est plus **fragile** après l'intervention. Il faut donc porter **une coquille** sur l'œil la nuit pendant la première semaine. Ne vous frottez pas l'œil.
- Le lendemain de l'intervention, vous pouvez vous laver délicatement le visage. Vous pouvez également prendre une douche ou un bain, mais évitez les projections d'eau, de savon et de shampoing directement dans l'œil pendant les trois premiers jours.
- Vous **pouvez faire des sports**. La natation et le sauna doivent être évités pendant 1 mois.
- Ne vous **maquillez pas** pendant une semaine.
- Concertez-vous avec le médecin pour voir quand vous pourrez à nouveau conduire.

CALENDRIER GOUTTES OPHTALMIQUES

Trafloxal® edo gtt ou Trafloxal® pomade	3 x par jour pour 1 semaine
Des larmes artificielles sans conservateurs	Si nécessaire

Vous trouverez plus amples explications sur l'utilisation des gouttes ophtalmiques dans la brochure www.uzleuven.be/brochure/700730 (en néerlandais) ou www.uzleuven.be/fr/brochure/700730 (en français).

EN CAS DE PROBLÈME OU POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

- Vous pouvez appeler le standard téléphonique pendant la journée au +32 16 33 23 70. Ils pourront ainsi vous mettre en communication avec l'hôpital de jour.
- À partir de 18 heures et le week-end, vous pouvez contacter l'ophtalmologue de garde, joignable via le standard au +32 16 33 22 11.