



# Antibiothérapie intraveineuse par la flucloxacilline

informations à l'attention du patient

## REMARQUES PRÉLIMINAIRES

Vous rentrez chez vous après une hospitalisation dans un service infirmier et avez encore besoin de l'administration à domicile d'antibiotiques par voie intraveineuse pour traiter une infection bactérienne.

Vous serez traité(e) avec de la ceftriaxone. Pendant votre hospitalisation, votre médecin, un membre du personnel infirmier ou le pharmacien hospitalier vous a déjà donné des informations orales en ce qui concerne votre antibiothérapie. Cette brochure vous propose une vue d'ensemble pratique de l'antibiothérapie par la flucloxacilline. Vous y trouverez des informations spécifiques par rapport à votre traitement, son administration, les effets secondaires possibles, mais également quelques conseils. Ensuite, nous énumérons les cas de figure dans lesquels vous devez contacter votre médecin (traitant) ou votre infirmier/ère (à domicile).

La poursuite de votre antibiothérapie intraveineuse à domicile s'inscrit dans le cadre du programme de soins OPAT. **OPAT est l'abréviation des termes anglais « Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy » (antibiothérapie parentérale ambulatoire).** Il s'agit donc de l'administration parentérale d'un agent antimicrobien sans nécessiter l'hospitalisation du patient. L'adjectif « parentéral » signifie que l'administration ne se fait pas par le système gastro-intestinal (par exemple après avoir avalé un comprimé), mais d'une autre manière, par exemple par injection ou par perfusion.

Si vous avez encore des questions après avoir lu la brochure, n'hésitez pas à les poser. Le médecin, le pharmacien hospitalier ou encore un membre du personnel infirmier se fera un plaisir de vous donner de plus amples explications.

## QU'EST-CE QUE LA FLUCLOXACILLINE ?

La flucloxacilline est un antibiotique destiné à traiter une infection bactérienne. C'est un **bactéricide** : il perturbe la fabrication de la paroi cellulaire des bactéries.

## QUELLE DOSE VAIS-JE RECEVOIR ?

Si vous avez une fonction rénale normale, on vous administrera une dose de **6 grammes ou 12 grammes de flucloxacilline toutes les 24 heures**, en fonction du type d'infection que vous présentez. Il faudra adapter la dose selon l'état rénal chez les patients présentant une insuffisance rénale.

## COMMENT LA FLUCLOXACILLINE EST-ELLE ADMINISTRÉE ?

On administre la flucloxacilline par **une perfusion continue une fois par jour (pendant 24 heures) ou deux fois par jour (pendant 12 heures)**. Votre médecin vous indiquera la forme d'administration qui vous convient.

La durée du traitement dépend du type d'infection et de la durée de l'antibiothérapie que vous avez déjà reçue à l'hôpital.

L'administration se fait à l'aide d'une **pompe élastométrique (Infusor<sup>®</sup>, voir photo)**.



L'Infusor<sup>®</sup> est un petit flacon portatif. Il permet au patient de continuer à pratiquer globalement ses activités quotidiennes pendant le traitement.

Pour en savoir plus sur l'administration par la pompe élastométrique, veuillez consulter la brochure « Infusor<sup>®</sup> ».

## OÙ LE TRAITEMENT EST-IL ADMINISTRÉ ?

Le traitement commence pendant votre hospitalisation. Il se poursuit au domicile en suivant le programme de soins OPAT.

Votre infirmier/ère à domicile préparera l'Infusor® avec l'antibiotique pour le brancher à votre cathéter. Il/elle s'en chargera chaque jour à votre domicile.

Des informations plus détaillées sur la préparation de la pompe élastométrique seront fournies à votre infirmière à domicile.

Le pharmacien hospitalier remettra l'antibiotique et le matériel nécessaire à la préparation et à l'administration de l'antibiotique dès que vous pourrez sortir de l'hôpital.

Dans le cas d'un traitement à domicile de longue durée avec une antibiothérapie, il est possible que tout le matériel pour toute la durée du traitement ne puisse pas être administré en une seule fois. Il se peut alors que vous deviez retirer un ou plusieurs paquets supplémentaires de matériel à la pharmacie de l'hôpital de l'UZ Leuven au cours de votre traitement à domicile. L'équipe OPAT vous en informera clairement. La pharmacie de l'hôpital ('ziekenhuisapotheek') se trouve sur le campus du Gasthuisberg, via 'Gele Straat, poort 1, niveau 2' (GE 1.2).

## COMMENT LE SUIVI DU TRAITEMENT EST-IL ASSURÉ ?

Votre médecin traitant décidera si et quand vous reviendrez à la consultation pour un suivi thérapeutique, une prise de sang et/ou un examen clinique.

Le prélèvement sanguin permet de contrôler les aspects suivants :

- **Les taux d'inflammation** dans le sang : pour contrôler le traitement, il faut vérifier les taux d'inflammation dans le sang.
  - **La fonction rénale** : il faut suivre la fonction rénale parce que la flucloxacilline est principalement éliminée par la voie rénale.
  - Le traitement par la flucloxacilline peut influencer :
    - le nombre de cellules sanguines et de plaquettes
    - la fonction rénale
    - le taux de potassium dans le sang
- Vous ne le ressentirez probablement pas vous-même, mais le médecin peut surveiller ces aspects en prélevant des échantillons de sang.

## COMMENT FAUT-IL CONSERVER LA FLUCLOXACILLINE ?

Il convient de conserver les flacons de flucloxacilline non ouverts dans leur emballage d'origine, à température ambiante (15-25 °C), dans un endroit sec et sombre, hors de portée des enfants.

La solution de flucloxacilline doit toujours être préparée juste avant l'administration.

## QUELS SONT LES EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES ?

Certaines personnes peuvent présenter de nombreux effets secondaires, et d'autres pas. Les effets secondaires qui surviennent n'ont aucun rapport avec l'effet du traitement. N'hésitez pas à contacter votre médecin (traitant) ou votre infirmier/ère (à domicile) si vous avez des questions ou des doutes éventuels.

Les effets secondaires suivants sont possibles :

- ✓ Troubles gastro-intestinaux : diarrhée, nausées, vomissements et troubles digestifs
- ✓ Confusion, contractions musculaires et agitation
- ✓ Éruption cutanée (avec démangeaisons)

## QUE FAIRE EN CE QUI CONCERNE LES INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MÉDICAMENTS ?

- Indiquez au médecin et au pharmacien de l'hôpital les **autres médicaments**, les vitamines, les compléments alimentaires, etc., que vous prenez (qu'ils soient prescrits par votre médecin traitant ou que vous les preniez de votre propre chef).
- Avant le traitement de votre infection, **indiquez à votre médecin traitant l'antibiothérapie** que vous recevez.

## QUELQUES CONSEILS

- Si vous avez une hypersensibilité connue à certains antibiotiques, veuillez l'indiquer au médecin de l'hôpital. Il convient en effet de faire preuve de prudence dans l'utilisation de la flucloxacilline chez les patients qui présentent une **hypersensibilité** connue aux antibiotiques à base de pénicilline.
- En cas de réactions d'**hypersensibilité grave** telles qu'éruption cutanée (éventuellement sur tout le corps), démangeaisons, sensation d'oppression, hypotension artérielle, fièvre ou frissons, gonflement des lèvres, de la langue ou de la gorge, vous devez immédiatement en informer votre médecin traitant.
- Si on vous connaît une **jaunisse ou une insuffisance hépatique** dans vos antécédents, vous devez le signaler à votre médecin traitant. La prudence s'impose dans ce groupe de patients.
- Si vous présentez une **diarrhée aiguë ou persistante**, même après l'arrêt du traitement, il est impératif d'en avertir votre médecin traitant sans délai.
- **Prenez régulièrement votre température**, idéalement au même moment de la journée et de préférence le soir.

## QUI DEVEZ-VOUS CONTACTER ET QUAND ?

- ✓ **Présentez-vous au service des urgences :**
  - si vous avez de la fièvre avec frissons (> 38°C)
- ✓ **Contactez votre médecin traitant :**
  - si vous avez les symptômes suivants : frissons, maux de tête, maux de gorge, crampes abdominales, sensations de brûlure en urinant, etc. Ne prenez jamais de médicaments de votre propre chef si vous pensez avoir une infection.
  - si vous faites une réaction à l'antibiotique lui-même : signes d'une réaction allergique, diarrhée aiguë, éruption cutanée, agitation ou saignements..
- ✓ **Contactez l'infirmier/ère à domicile :**
  - si vous avez des problèmes avec le cathéter : une veine douloureuse, des rougeurs, un gonflement, un sentiment de chaleur et/ou de douleur autour du cathéter.

## COORDONNÉES UTILES

- ✓ L'équipe OPAT de l'hôpital :
  - Par téléphone : +32 16 34 32 74  
(accessible entre 8 h 30 et 16 h 30 les jours ouvrables)
  - Par courriel : [OPAT@uzleuven.be](mailto:OPAT@uzleuven.be). Votre question sera traitée dans les plus brefs délais, mais cela peut prendre 48 heures. Le courrier électronique n'est pas relevé le weekend.

Cette brochure est également disponible à l'adresse  
[www.uzleuven.be/fr/brochure/700849](http://www.uzleuven.be/fr/brochure/700849).





© Octobre 2024 UZ Leuven

La copie de ce texte et de ses illustrations n'est possible qu'avec la permission du service Communication de l'UZ Leuven.

Conception et réalisation

Ce texte a été rédigé par la pharmacie hospitalière en collaboration avec le service Communication.

Elle a été validée par le groupe de travail OPAT le 10 janvier 2017.

Cette brochure est également disponible à l'adresse [www.uzleuven.be/fr/brochure/700849](http://www.uzleuven.be/fr/brochure/700849).

Faites-nous parvenir vos remarques et suggestions à propos de cette brochure à l'adresse [communicatie@uzleuven.be](mailto:communicatie@uzleuven.be).

Éditeur responsable  
UZ Leuven  
Herestraat 49  
3000 Louvain  
tél. : 016 33 22 11  
[www.uzleuven.be](http://www.uzleuven.be)

 mynexuzhealth



Consultez votre dossier médical  
sur [nexuzhealth.com](http://nexuzhealth.com)  
ou téléchargez l'application

