

IMURAN® (Azathioprine)

Imuran® is een geneesmiddel dat een invloed heeft op het afweersysteem. Het heeft een onderdrukkend effect op de celdeling van ontstekingscellen. Hierdoor kan Imuran® ontstekingen afremmen, pijn en zwelling verminderen en ochtendstijfheid terugdringen. Imuran® wordt voorgeschreven aan patiënten met reumatische aandoeningen zoals reumatoïde artritis, lupus (SLE) en polymyositis.

Werking

Imuran® werkt langzaam en is pas optimaal na zes tot acht weken inname. Daarom wordt Imuran® in het begin van de behandeling vaak gecombineerd met andere medicatie zoals pijnstillende en ontstekingsremmende geneesmiddelen. De dosering van Imuran® kan in de loop van de behandeling soms gewijzigd worden.

Overleg met uw arts als u wilt stoppen met het gebruik van Imuran®. Indien gewenst kan Imuran® jarenlang gebruikt worden.

Wijze van inname

Imuran® wordt toegediend onder de vorm van tabletten van 25 of 50 mg in een of meerdere doseringen daags. De voorgeschreven hoeveelheid wordt gebaseerd op uw lichaamsgewicht.

U moet de tabletten in het geheel doorslikken met water, bijvoorbeeld tijdens de maaltijd.

U mag de tabletten niet fijnmaken of erop kauwen.

Mogelijke nadelige effecten

De volgende bijverschijnselen kunnen zich voordoen onder behandeling met Imuran®:

Bijwerkingen op korte termijn

Enkele uren of dagen na het starten met Imuran® kunt u last krijgen van:

X Misselijkheid, braken, verminderde eetlust, diarree

Om deze verschijnselen zo veel mogelijk te beperken kunt u de maaltijden het best nuttigen op tijdstippen dat de klachten minder zijn. Gebruik lichte maaltijden en eet vaker op een dag. Ook het innemen van de Imuran® vóór het slapengaan kan deze bijwerkingen verminderen.

X Huiduitslag

Deze uitslag is een uiting van een allergische reactie en zal verdwijnen na het stoppen van Imuran®.

Bijwerkingen op langere termijn.

Enkele weken of maanden na aanvang van het gebruik van Imuran® kunt u last krijgen van:

X Een verhoogde kans op infecties

Dit wordt veroorzaakt door het effect van het medicijn op het beenmerg waar bloedcellen worden gemaakt. Er kan een vermindering optreden in de aanmaak van witte bloedcellen. Deze witte bloedcellen spelen een rol in het afweermecanisme van ons lichaam.

X Spontaan blauwe plekken

Dit is het gevolg van een verminderde aanmaak van bloedplaatjes door het gebruik van Imuran®. Bloedplaatjes zijn van belang voor een goede bloedstolling.

X Leverfunctiestoornissen

Deze kunnen ongemerkt optreden. Verder gevorderde stoornissen kunnen een gele verkleuring van het oogwit of de huid veroorzaken maar zijn eerder zeldzaam.

Waarschuw altijd uw arts bij het optreden van bovenstaande verschijnselen of bij andere lichamelijke klachten tijdens de behandeling.

Aandachtspunten

X Als u koorts of blauwe plekken hebt op het lichaam of als u andere lichamelijke veranderingen tijdens de behandeling opmerkt waarvan u zich afvraagt of ze met het gebruik van Imuran® samenhangen, neem dan contact op met uw reumatoloog.

X Door regelmatig bloed te onderzoeken, kunnen vroegtijdig tekenen van lever- of beenmergbeschadiging worden opgespoord. Hou u daarom goed aan de afspraken voor bloedcontrole (best 2 tot 3-maandelijks).

X Als u naast Imuran® urinezuurverlagende middelen gebruikt (bijvoorbeeld bij jicht), moet u uw arts hiervan op de hoogte stellen. De dosis Imuran® wordt dan aangepast.

X Men zal geen behandeling met Imuran® instellen in geval van zwangerschap of bij patiënten bij wie een zwangerschap op korte termijn mogelijk is. In geval van zwangerschapswens bespreek dit met uw reumatoloog.

X Er werden gevallen van vroegtijdige geboorte en van laag geboortegewicht gemeld na blootstelling aan Imuran®, in het bijzonder in combinatie met corticosteroiden. Er werden eveneens gevallen van miskraam gemeld na inname van Imuran® door moeder of vader.

Vermoedt u nevenwerkingen? Vermijd het eigenhandig stopzetten van de therapie en bespreek dit eerst met uw arts.