

Je therapie: elranatamab (Elrexio®)

WAT IS DE SAMENSTELLING VAN DEZE THERAPIE?

De therapie bestaat uit één celremmend geneesmiddel (immunotherapie), namelijk **elranatamab**. Dit middel helpt het eigen immuunsysteem om kankercellen aan te vallen. Elranatamab brengt immuuncellen met de kankercellen in verbinding, waardoor het immuunsysteem de kankercellen makkelijker kan vernietigen. Daarnaast kunnen er nog andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Die dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om bijwerkingen te beperken.

HOE VERLOOPT DE THERAPIE?

- Eén cyclus duurt **4 weken (28 dagen)**. De volgende cyclus start in principe 4 weken na dag 1 van de vorige cyclus, als je bloedsuitslagen en je algemene toestand dit toelaten.
- Tijdens de **eerste cyclus** wordt de dosis van elranatamab stapsgewijs opgebouwd. Op dag 1 en dag 4 van de eerste cyclus krijg je een lagere dosis toegediend. Wanneer je dit goed verdraagt, krijg je vanaf dag 8 de volledige dosis elranatamab. Deze dosis krijg je vanaf dan wekelijks, dus ook op dag 15 en dag 22.
- Van **cyclus 2 tot cyclus 6** wordt elranatamab wekelijks toegediend.
- Vanaf cyclus 7** wordt de behandeling tweewekelijks toegediend.

Generieke naam	Merknaam	Cyclus	Dag					Wijze van toediening
			1	4	8	15	22	
Elranatamab	Elrexio®	Cyclus 1	•	•	•	•	•	Onderhuidse inspuiting
		Cyclus 2-6	•		•	•	•	
		Vanaf cyclus 7	•			•		
Ondersteunende medicatie								
Tijdens de eerste drie toedieningen (op dag 1, 4 en 8) krijg je vóór elke toediening van elranatamab 1 tablet cetirizine (Zyrtec®) 10 mg, 1 tablet/briustablet paracetamol (Dafalgan®) 500 mg en 1 tablet dexamethason. Afhankelijk van hoe je de therapie verdraagt, kan de arts vanaf de vierde toediening op dag 15 beslissen dat deze medicatie niet meer nodig is.								

WAAR WORDT DE THERAPIE TOEGEDIEND?

Tijdens de eerste drie toedieningen van elranatamab blijf je gedurende 48 uur in het ziekenhuis. Je arts en verpleegkundige zullen tijdens en na deze toediening eventuele klachten en bijwerkingen opvolgen.

Als deze toedieningen goed verlopen, krijg je elranatamab vanaf de vierde toediening in het dagziekenhuis oncologie. Een overnachting is dan niet nodig.

AANDACHTSPUNTEN BIJ ELRANATAMAB


- Tijdens de eerste toediening en mogelijk ook tijdens de tweede toediening, kan er zich een ontstekingsreactie voordoen, namelijk het '**cytokine release'-syndroom** (CRS). Om die reden volgt je zorgteam eventuele klachten en bijwerkingen op. Bij volgende toedieningen gebeurt dat zelden. Vóór de toediening van elranatamab krijg je ondersteunende medicatie toegediend om klachten van CRS te verminderen. Mogelijke tekenen van CRS zijn koorts, koude rillingen, snelle hartslag, duizeligheid, misselijkheid, huiduitslag en kortademigheid. Wanneer je een van deze klachten ondervindt, is het belangrijk dat je dat direct meldt aan de arts of verpleegkundige.

- Een behandeling met elranatamab kan **invloed hebben op het zenuwstelsel**. Deze bijwerking is **uiterst zeldzaam** maar het is belangrijk om symptomen snel te herkennen. Dit kan zich op verschillende manieren uiten, bijvoorbeeld:

- Moeilijkheden met denken of concentreren
- Problemen met spreken, zoals moeite om woorden te vinden of een onduidelijke spraak
- Veranderingen in alertheid, zoals trager reageren of slaperigheid
- Hoofdpijn die plotseling optreedt of ernstiger wordt
- Zwakte of een tintelend gevoel in de ledematen
- Problemen met je zicht, zoals wazig of dubbelzien
- Moeite hebben met schrijven

Als je na de behandeling thuis een van bovenstaande symptomen ervaart, meld dit onmiddellijk aan je arts. Het kan zijn dat er extra onderzoeken of een extra behandeling nodig zijn.

- Door de behandeling met elranatamab kunnen er afwijkingen optreden in je bloed, zoals **bloedarmoede, een verlaagd aantal witte bloedcellen of bloedplaatjes**. Door deze veranderingen ben je tijdens je behandeling **vatbaarder voor infecties**. Symptomen van een infectie kunnen variëren afhankelijk van de locatie in je lichaam. Als je klachten hebt die kunnen wijzen op een infectie, raadpleeg dan je behandelende arts of huisarts. Mogelijke tekenen van een infectie zijn: temperatuur boven 38°C en/of koude rillingen, keelpijn, gevoel van kortademigheid, hoest, hoofdpijn, pijn en/of branderig gevoel bij het plassen. Andere klachten zoals vermoeidheid, wondjes die langer blijven bloeden of als je sneller blauwe plekken krijgt, vermeld je aan je zorgverleners.
- Het is mogelijk dat je door de toediening van elranatamab last krijgt van hoofd- en gewrichtspijn. Als je veel last ervaart, mag je tot vier keer per dag 1 gram paracetamol innemen. Controleer best eerst je lichaamstemperatuur om na te gaan of je geen koorts hebt.



NEVENWERKINGEN OPVOLGEN, TIJDIG MELDEN EN BESPREKEN

Volg je klachten goed op, meld en bespreek ze tijdig met je zorgverleners. Je kan je **klachten opvolgen** aan de hand van een **papieren of elektronisch dagboek**. Ervaar je ernstige of aanhoudende klachten of je bent ongerust over bepaalde klachten, aarzel dan niet je zorgverleners in het ziekenhuis of je huisarts te contacteren.



MOGELIJKE NEVENWERKINGEN AANPAKKEN

Bij jouw behandeling kunnen zich ook de volgende nevenwerkingen voordoen:

- Verminderd aantal witte bloedcellen
- Verminderd aantal rode bloedcellen
- Verminderd aantal bloedplaatjes
- Invloed op seksualiteit en vruchtbaarheid
- Gevoelens van angst boosheid en verdriet
- Misselijkheid en braken
- Smaak- en reukveranderingen
- Huidveranderingen
- Ongewone vermoeidheid