

Je therapie: PCV

DEZE BIJLAGE HOORT BIJ DE GIDS BIJ JE ONCOLOGISCHE BEHANDELING MET TABLETTEN OF CAPSULES.

WAT IS DE SAMENSTELLING VAN DEZE THERAPIE?

De therapie bestaat uit drie celremmende geneesmiddelen, namelijk **procarbazine**, **lomustine** en **vincristine**. Deze cytostatica beïnvloeden de celdeling en hebben als doel de groei van kankercellen te vertragen of te remmen. Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Die dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om de bijwerkingen te beperken.

HOE VERLOOPT DE THERAPIE?

Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de chemotherapie. Eén cyclus duurt **6 weken (42 dagen)** en omvat **3 dagopnames** voor chemotherapie. Dag 1 is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus. De volgende cyclus start in principe 6 weken na dag 1, als de bloedsuitslagen en je algemene toestand dit toelaten.

Generieke naam	Merknaam	Week	Dag							Wijze van toediening
Lomustine	CCNU®	1	1	2	3	4	5	6	7	Capsule
			.							
Vincristine	Oncovin®	2	8	9	10	11	12	13	14	Infuus over 10 minuten
Procarbazine	Natulan®		.							
Procarbazine	Natulan®	3	15	16	17	18	19	20	21	Capsule
			
Rustweek		4	22	23	24	25	26	27	28	
Vincristine	Oncovin®	5	29	30	31	32	33	34	35	Infuus over 10 minuten
			.							
Rustweek		6	36	37	38	39	40	41	42	

Inname van lomustine

- Lomustine wordt **op een lege maag of bij een maaltijd** ingenomen, bij voorkeur voor het slapengaan. Inname van lomustine op een nuchtere maag kan voor minder misselijkheid zorgen.
- Wanneer je de dosis lomustine bent **vergeten**, neem die dan in zodra je er aan denkt. Merk je pas na 2 dagen dat de dosis is blijven liggen, haal die dan niet meer in. Meld een vergeten dosis bij je volgende ziekenhuisbezoek.
- Interacties met voeding:** vermijd tijdens de inname van lomustine het eten of drinken van pompoelmoes(sap), Sevilla-sinaasappels en preparaten op basis van sint-janskruid.

Inname van procarbazine

- Procarbazine wordt **systematisch bij de maaltijd** ingenomen.
- Wanneer je een dosis procarbazine bent **vergeten**, sla dan de vergeten dosis over. Neem geen dubbele dosis om de gemiste dosis in te halen. Neem de volgende dosis op het geplande tijdstip. Meld een vergeten dosis bij je volgende ziekenhuisbezoek.
- Interacties met voeding:** vermijd het drinken van alcohol op de dagen dat je procarbazine moet innemen.

Algemene richtlijnen rond de inname, bewaring en manipulatie en wat je het best doet als zich bepaalde situaties voordoen, kan je vinden in de Gids bij je oncologische behandeling met capsules of tabletten.

WAAR WORDT DE THERAPIE TOEGEDIEND?

Je behandeling met PCV vindt plaats via het [oncologisch dagziekenhuis](#). Een overnachting is niet nodig.

- Op **dag 1** kom je naar het ziekenhuis voor een bloedafname. Als je bloedwaarden goed zijn, krijg je de capsule(s) lomustine mee naar huis. Je arts of verpleegkundige vertelt je hoeveel capsules je moet innemen. 's Avonds thuis neem je de capsule(s) lomustine in.
- Er staat een nieuwe bloedafname gepland op **dag 8**. Als je bloedwaarden goed zijn, krijg je vincristine via een infuus. Deze dag krijg je ook capsules procarbazine mee naar huis. Die neem je 14 dagen lang in.
- Op **dag 29** kom je opnieuw naar het ziekenhuis voor een bloedafname. Als je bloedwaarden goed zijn, krijg je opnieuw vincristine toegediend via een infuus.

AANDACHTSPUNTEN BIJ PCV

- Omwille van je ziekte mag je (tijdelijk) **niet met de wagen rijden**. Met een medisch attest kan je (al dan niet) gedeeltelijk rijgeschikt verklaard worden. Bespreek met je verpleegkundige of sociaal werker als je vervoersproblemen hebt om in het ziekenhuis te geraken.



NEVENWERKINGEN VOORKOMEN (zie gids)

Bescherm jezelf tegen een aantal nevenwerkingen door:



Infecties voorkomen



Mondhygiëne en mondspoeling



Huidverzorging



Wondjes voorkomen



Rust en beweging



Voorgeschreven medicatie innemen



Voldoende drinken

Bij jouw behandeling zijn ook de volgende adviezen belangrijk om nevenwerkingen te voorkomen:



Bloeddruk meten



Hand- en voetverzorging



Nagelbescherming



NEVENWERKINGEN OPVOLGEN, TIJDIG MELDEN EN BESPREKEN

Volg je klachten goed op, meld en bespreek ze tijdig met je zorgverleners. Je kan je [klachten opvolgen](#) aan de hand van een [papieren of elektronisch dagboek](#). Je leest er meer over in de gids. Ervaar je ernstige of aanhoudende klachten of je bent ongerust over bepaalde klachten, aarzel dan niet je zorgverleners in het ziekenhuis of je huisarts te contacteren. '[Alarmsignalen](#)' en [contactgegevens](#) vind je in de gids.



MOGELIJKE NEVENWERKINGEN AANPAKKEN (zie gids)

Bij jouw behandeling kunnen zich de volgende nevenwerkingen of klachten voordoen:

- ~~Buikloop of diarree~~
- Huidveranderingen zoals:
 - Droge huid, schilfering, jeuk, huiduitslag
 - ~~Huiduitslag in de vorm van puistjes~~
 - ~~Huidveranderingen aan de handpalmen en voetzolen~~
- Misselijkheid en braken
- Smaak- en reukveranderingen
- Mondslijmvliesontsteking (aften)
- Een verminderd aantal witte bloedcellen
- Een verminderd aantal rode bloedcellen
- Een verminderd aantal bloedplaatjes
- ~~Haarveranderingen~~
- ~~Nagelveranderingen~~
- Verstopping
- Verhoogde bloeddruk
- ~~Tintelingen en voos gevoel~~
- Spier- en gewrichtspijn
- Ongewone vermoeidheid
- Gevoelens van angst, boosheid en verdriet
- Invloed op de seksualiteit en vruchtbaarheid