Je therapie: lenvatinib (Lenvima® of Kisplyx®)

DEZE BIJLAGE HOORT BIJ DE *GIDS BIJ JE ONCOLOGISCHE BEHANDELING MET TABLETTEN OF CAPSULES.*

WAT IS DE SAMENSTELLING VAN DEZE THERAPIE?

De therapie bestaat uit één celremmend geneesmiddel, namelijk lenvatinib. Lenvatinib is een doelgerichte therapie. Het blokkeert specifieke eiwitten die betrokken zijn bij de ontwikkeling en de groei van kankercellen. Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Die dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om de bijwerkingen te beperken.

HOE VERLOOPT DE THERAPIE?

- Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. Eén cyclus duurt 4 weken (28 dagen). Lenvatinib wordt dagelijks ingenomen. De volgende cyclus start in principe 4 weken na dag 1, als de bloeduitslagen en je algemene toestand dit toelaten.
- Je komt naar de raadpleging of het oncologisch dagziekenhuis voor een bloedafname, een klinisch onderzoek en een (nieuwe) voorraad capsules. Je neemt de capsules thuis verder in.
- Lenvatinib bestaat in capsules van 4 mg en 10 mg. Je arts of verpleegkundige vertelt je welke dosis je dagelijks moet nemen. Afhankelijk van de ernst van de nevenwerkingen die je ondervindt, is een dosisverlaging mogelijk.

Lenvatinib (Lenvima® of Kisplyx®)		Week 1	Week 2	Week 3	Week 4
. . . . . mg 1 x per dag	 of	✔	✔	✔	✔

Inname

- Lenvatinib wordt één keer per dag ingenomen bij voorkeur ‘s morgens. Je neemt de capsules steeds rond hetzelfde tijdstip in.
- Lenvatinib wordt op een lege maag of bij de maaltijd ingenomen. Je neemt de medicatie best op een consequente manier in:
  - Ofwel steeds op een lege maag: dit betekent doorgaans niets eten vanaf 2 uur voor de inname tot 1 uur na de inname van lenvatinib
  - Ofwel steeds bij een maaltijd of ten laatste 30 minuten na de maaltijd

Wat als?

Als je een dosis lenvatinib bent vergeten, kan je de vergeten dosis inhalen tot 12 uur vóór de volgende dosis. Wanneer er minder dan 12 uur is vóór de volgende dosis, sla je de vergeten dosis over en neem je de volgende dosis op het geplande tijdstip. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Meld een vergeten dosis bij je volgende ziekenhuisbezoek.

Algemene richtlijnen rond de inname, bewaring en manipulatie en wat je het best doet als zich bepaalde situaties voordoen, kan je vinden in de *Gids bij je oncologische behandeling met tabletten of capsules*.

AANDACHTSPUNTEN BIJ LENVATINIB

- Lenvatinib kan schadelijk zijn voor een ongeboren baby. Gebruik naast hormonale anticonceptie (pil, hormoonpleister, ring, spiraaltje, …) ook altijd een barrièremiddel (zoals een condoom) tijdens en tot minstens één maand na de laatste inname van lenvatinib. Bespreek met je arts of zorgverleners wat de beste anticonceptiemethoden zijn voor jou en je partner.

- Lenvatinib kan je bloeddruk verhogen. Daarom wordt je bloeddruk gecontroleerd tijdens elk ziekenhuisbezoek. Het is belangrijk je bloeddruk ook thuis op te volgen. Je kan de bloeddruk noteren in het dagboekje. Zo kan je arts de evolutie goed opvolgen. Soms kan er medicatie nodig zijn om de bloeddruk te verlagen.
- Tijdens elk ziekenhuisbezoek zal je in het dagziekenhuis om een urinestaal gevraagd worden. Zo controleert je verpleegkundige het eiwitgehalte in je urine. Door je behandeling met lenvatinib kan het eiwitgehalte in je urine immers te veel verhogen.
- Door lenvatinib kan de wondgenezing vertragen. Bespreek geplande ingrepen (bijvoorbeeld aan je tanden) altijd eerst met je arts. Soms worden bepaalde ingrepen tijdens je behandeling afgeraden. Om diezelfde reden is het ook belangrijk dat je wonden toont aan je arts of verpleegkundige, zodat zij een goede verzorging kunnen geven. Bij plotse pijn, zwelling of andere abnormale klachten moet je meteen contact opnemen met je (huis)arts.



NEVENWERKINGEN VOORKOMEN (zie gids)

Bescherm jezelf tegen een aantal nevenwerkingen door:

- Infecties voorkomen
- Mondhygiëne en mondspoeling
- Huidverzorging
- Wondjes voorkomen
- Rust en beweging
- Voorgeschreven medicatie innemen
- Voldoende drinken

Bij jouw behandeling zijn ook de volgende adviezen belangrijk om nevenwerkingen te voorkomen:

- Bloeddruk meten
- Hand- en voetverzorging
- ~~Nagelbescherming~~



NEVENWERKINGEN OPVOLGEN, TIJDIG MELDEN EN BESPREKEN

Volg je klachten goed op, meld en bespreek ze tijdig met je zorgverleners. Je kan je klachten opvolgen aan de hand van een papieren of elektronisch dagboek. Je leest er meer over in de gids. Ervaar je ernstige of aanhoudende klachten of je bent ongerust over bepaalde klachten, aarzel dan niet je zorgverleners in het ziekenhuis of je huisarts te contacteren. 'Alarmsignalen' en contactgegevens vind je in de gids.



MOGELIJKE NEVENWERKINGEN AANPAKKEN (zie gids)

Bij jouw behandeling kunnen zich de volgende nevenwerkingen of klachten voordoen:

- Buikloop of diarree
- Huidveranderingen zoals:
  - Droge huid, schilfering, jeuk, huiduitslag
  - ~~Huiduitslag in de vorm van puistjes~~
  - Huidveranderingen aan de handpalmen en voetzolen
- Misselijkheid en braken
- ~~Smaak- en reukveranderingen~~
- Mondslijmvliesontsteking (aften)
- ~~Een verminderd aantal witte bloedcellen~~
- ~~Een verminderd aantal rode bloedcellen~~
- ~~Een verminderd aantal bloedplaatjes~~
- ~~Haarveranderingen~~
- ~~Nagelveranderingen~~
- Verstopping
- Verhoogde bloeddruk
- ~~Tintelingen en vreemd gevoel~~
- Spier- en gewrichtspijn
- Ongewone vermoeidheid
- Gevoelens van angst, boosheid en verdriet
- Invloed op de seksualiteit en vruchtbaarheid

© UZ Leuven | 701213_v112026