

Je therapie: paclitaxel albumine (Abraxane[®]) - atezolizumab (Tecentriq[®]) (MBC)

DEZE BIJLAGE HOORT BIJ DE GIDS CHEMOTHERAPIE.

WAT IS DE SAMENSTELLING VAN DEZE THERAPIE?

De therapie bestaat uit twee verschillende celremmende geneesmiddelen: paclitaxel albumine (cytostaticum) en één immunotherapie: atezolizumab. Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Die dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om de bijwerkingen te beperken.

HOE VERLOOPT DE THERAPIE?

Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. Eén cyclus duurt 4 weken (28 dagen) en omvat 3 opnames voor therapie. Dag 1 is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus. De volgende cyclus start in principe vier weken na dag 1, als de bloeuitslagen en je algemene toestand dit toelaten.

Generieke naam	Merknaam	Dag						Wijze van toediening
		1	2-7	8	9-14	15	16-28	
Atezolizumab	Tecentriq [®]	•				•		1e toediening: infuus over 60 minuten Vanaf de 2e toediening: infuus over 30 minuten
Paclitaxel albumine	Abraxane [®]	•		•		•		Infuus over 30 minuten

WAAR WORDT DE THERAPIE TOEGEDIEND?

De behandeling kan in het dagziekenhuis gebeuren. Overnachting is dan niet nodig.

AANDACHTSPUNTEN BIJ PACLITAXEL ALBUMINE - ATEZOLIZUMAB

- Gedurende de behandeling met paclitaxel albumine vermijd je het eten of drinken van pompelmoes(sap), en het gebruik van preparaten op basis van sint-janskruid (sint-janskruid bestaat onder andere in druppels en tabletten van A.Vogel). Die producten hebben mogelijk een nadelige invloed op de werking van de therapie.
- Soms krijg je door deze medicijnen last van wazig zicht, tranende of rode ogen of een ontsteking aan de ogen. Neem contact op met je behandelende arts als je dat ervaart.
- Mogelijk stapel je door de behandeling met paclitaxel albumine vocht op. Je gewicht kan daardoor toenemen.
- In zeldzame gevallen krijgt iemand een infuusreactie op **atezolizumab**. Een infuusreactie kenmerkt zich door huiduitslag (eventueel over heel het lichaam), een gevoel van benauwdheid, lage bloeddruk, koorts of rillingen. Soms gaat een reactie gepaard met een gevoel van misselijkheid of met overmatig transpireren. Het is belangrijk dat je dergelijke gewaarwordingen onmiddellijk meldt aan de verpleegkundige of arts, zodat er vlug en adequaat kan worden gereageerd.



- Het gebeurt soms dat immunotherapie niet alleen de kankercellen aanvalt, maar ook het eigen lichaam. Bepaalde organen (bijvoorbeeld de lever, de darmen, longen, huid en klieren) kunnen daardoor ontstoken raken. We spreken dan van een **auto-immunreactie**. Die reactie kan zich uiten onder de vorm van klachten die onschuldig lijken, zoals jeuk, buikpijn en diarree.



- Het is erg belangrijk dat een auto-immunreactie tijdig wordt vastgesteld en behandeld. **Neem daarom onmiddellijk contact op met je behandelende arts als je de volgende klachten ervaart:**



Kortademigheid
Hoesten



Huiduitslag
Jeuk
Geel worden van de huid



Geel worden van het oogwit
Slecht zien



Minder of net meer plassen
Donkere urine
Diarree of buikloop
Bloed in de ontlasting



Hoofdpijn
Buikpijn
Pijn ter hoogte van de lever
(= rechts van de maagstreek)
Pijnlijke of gezwollen
gewrichten



Vermoeidheid
Lusteloosheid
(Spier)zwakte
Sufheid



Gewichtsverandering (zonder
dat je eetpatroon is veranderd)
Gewichtsverlies ondanks méér
eetlust



Extreme dorst



Veranderde stemming
Gedepimeerd
Sneller geïrriteerd
Opvliegend zijn

NEVENWERKINGEN VOORKOMEN (zie brochure)

Bescherm jezelf tegen een aantal nevenwerkingen door:



Infecties voorkomen



Mondhygiëne en
mondspoeling



Huidverzorging



Wondjes voorkomen



Rust en beweging



Voorgeschreven
medicatie innemen



Voldoende drinken

Bij jouw behandeling zijn ook de volgende adviezen belangrijk om nevenwerkingen te voorkomen:



~~Hand- en voetverzorging~~



~~Koude voeding en dranken vermijden~~



~~Nagelverzorging~~



Een alternatief (pruik, sjaltje ...) voorzien

MOGELIJKE NEVENWERKINGEN AANPAKKEN (zie brochure)

Een verminderd aantal witte bloedcellen
Een verminderd aantal rode bloedcellen
Een verminderd aantal bloedplaatjes

Misselijkheid en braken
Smaak- en reukveranderingen
Mondslijmvliesontsteking (bv. aften)

Ongewone vermoeidheid
Invloed op de seksualiteit en intimiteit
Gevoelens van angst, boosheid en verdriet

Bij jouw behandeling kunnen zich ook de volgende nevenwerkingen voordoen:

- Buikloop of diarree
- Verstopping
- Haarverlies
- Huidveranderingen *tijdelijk huiduitslag*
- Handvoetsyndroom**
- Nagelveranderingen**
- Ooglast**
- ~~Oorsuizingen en verminderd gehoor~~
- Griepig gevoel *hoofdpijn en / of duizeligheid*
- Tintelingen of voos gevoel in vingertoppen en/of tenen

