

# Je therapie: larotrectinib (Vitrakvi®)

DEZE BIJLAGE HOORT BIJ DE GIDS BIJ JE ONCOLOGISCHE BEHANDELING MET TABLETTEN OF CAPSULES.


## WAT IS DE SAMENSTELLING VAN DEZE THERAPIE?

De therapie bestaat uit één celremmend geneesmiddel, namelijk larotrectinib. Larotrectinib is een doelgerichte therapie. Het blokkeert specifieke eiwitten die betrokken zijn bij de ontwikkeling en groei van kankercellen.

Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Die dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om de bijwerkingen te beperken.

## HOE VERLOOPT DE THERAPIE?

- Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. Eén cyclus duurt vier weken (28 dagen). De volgende cyclus start in principe vier weken na dag 1, als de bloeduitslagen en je algemene toestand dit toelaten.
- Op dag 1 kom je naar het **oncologisch dagziekenhuis** of de **raadpleging** voor een bloedafname, een klinisch onderzoek en een (nieuwe) voorraad capsules. Je neemt de capsules thuis verder in.
- Larotrectinib wordt **twee maal per dag** ingenomen, gedurende 28 dagen.
- Larotrectinib bestaat in capsules van 25 mg en 100 mg. Je arts of verpleegkundige vertelt je welke dosis je dagelijks moet nemen. Afhankelijk van de ernst van eventuele nevenwerkingen die je ondervindt, is een dosisverlaging mogelijk.

Larotrectinib (Vitrakvi®)		Week 1	Week 2	Week 3	Week 4
2x per dag . . . . . mg	 of 	✓	✓	✓	✓

### Inname

- Larotrectinib wordt **twee keer per dag** ingenomen, met 12 uur tussen beide innames. Je neemt de capsules steeds rond **hetzelfde tijdstip** in.
- Larotrectinib wordt (systematisch) **op een lege maag of bij de maaltijd** ingenomen.
- **Interactie met voeding of andere voedingssupplementen:** vermijd tijdens de inname van larotrectinib het eten of drinken van pomelmoes(sap) op preparaten op basis van sint-janskruid.

### Wat als?

Als je een dosis larotrectinib bent vergeten, en je merkt dit op binnen de 6 uur, dan kan je vergeten dosis inhalen. Merk je de vergeten dosis pas later op (meer dan 6 uur na de geplande inname), dan sla je de vergeten dosis over en neem je de volgende dosis op het geplande tijdstip. Meld een vergeten dosis bij je volgende ziekenhuisbezoek.

**Algemene richtlijnen rond de inname, bewaring en manipulatie en wat je het best doet als zich bepaalde situaties voordoen, kan je vinden in de Gids bij je oncologische behandeling met tabletten of capsules.**

## AANDACHTSPUNTEN BIJ LAROTRECTINIB

- Door de inname van larotrectinib merken sommige patiënten een **gewichtstoename**. Dit kan veroorzaakt worden door verandering van je eetlust, hoe snel je lichaam voedsel verwerkt (je stofwisseling of metabolisme) of door het vasthouden van vocht. Bespreek deze klachten met je zorgverleners als je hier last van hebt.
- Larotrectinib kan klachten van **duizeligheid** geven. Deze klachten komen vooral in de eerste drie maanden voor. Meld dit aan je verpleegkundige of je behandelende arts.
- Je behandeling met larotrectinib kan **spierpijn** veroorzaken. Als je daar last van hebt, mag je vier keer per dag 1 gram paracetamol (Dafalgan®) innemen.



### NEVENWERKINGEN VOORKOMEN (zie gids)

Bescherm jezelf tegen een aantal nevenwerkingen door:



Infecties voorkomen



Mondhygiëne en mondspoeling



Huidverzorging



Wondjes voorkomen



Rust en beweging



Voorgeschreven medicatie innemen



Voldoende drinken

Bij jouw behandeling zijn ook de volgende adviezen belangrijk om nevenwerkingen te voorkomen:




~~Bloeddruk meten~~



~~Hand- en voetverzorging~~



~~Nagelbescherming~~



### NEVENWERKINGEN OPVOLGEN, TIJDIG MELDEN EN BESPREKEN

Volg je klachten goed op, meld en bespreek ze tijdig met je zorgverleners. Je kan je **klachten opvolgen** aan de hand van een **papieren of elektronisch dagboek**. Je leest er meer over in de gids. Ervaar je ernstige of aanhoudende klachten of je bent ongerust over bepaalde klachten, aarzel dan niet je zorgverleners in het ziekenhuis of je huisarts te contacteren. 'Alarmsignalen' en **contactgegevens** vind je in de gids.



### MOGELIJKE NEVENWERKINGEN AANPAKKEN (zie gids)

Bij jouw behandeling kunnen zich de volgende nevenwerkingen of klachten voordoen:

- Buikloop of diarree
- ~~Huidveranderingen zoals:~~
  - ~~Droge huid, schilfering, jeuk, huiduitslag~~
  - ~~Huiduitslag in de vorm van puistjes~~
  - ~~Huidveranderingen aan de handpalmen en voetzolen~~
- Misselijkheid en braken
- Smaak- en reukveranderingen
- ~~Mondslimvliesontsteking (afters)~~
- Ongewone vermoeidheid
- Gevoelens van angst, boosheid en verdriet
- Invloed op de seksualiteit en vruchtbaarheid
- Een verminderd aantal witte bloedcellen
- Een verminderd aantal rode bloedcellen
- Een verminderd aantal bloedplaatjes
- ~~Haarveranderingen~~
- Verstopping
- ~~Verhoogde bloeddruk~~
- Tintelingen en voos gevoel
- Spier- en gewrichtspijn