UZ LEUVEN

Je therapie: acalabrutinib (Calquence®)

DEZE BIJLAGE HOORT BIJ DE *GIDS BIJ JE ONCOLOGISCHE BEHANDELING MET TABLETTEN OF CAPSULES.*

WAT IS DE SAMENSTELLING VAN DEZE THERAPIE?

De therapie bestaat uit één celremmend geneesmiddel, namelijk acalabrutinib. Acalabrutinib is een doelgerichte therapie. Het blokkeert specifieke eiwitten die betrokken zijn bij de ontwikkeling en de groei van kankercellen. Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Die dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om de bijwerkingen te beperken.

HOE VERLOOPT DE THERAPIE?

- Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. Eén cyclus duurt 4 weken (28 dagen). Acalabrutinib wordt twee keer per dag ingenomen.
- Je komt naar de raadpleging of het dagziekenhuis voor een bloedafname, een klinisch onderzoek en een voorraad capsules. Je neemt de capsules thuis verder in.
- Acalabrutinib bestaat in capsules van 100 mg. Je arts of verpleegkundige vertelt je welke dosis je dagelijks moet nemen. Afhankelijk van de ernst van de nevenwerkingen die je ondervindt, is een dosisverlaging mogelijk.

Acalabrutinib (Calquence®) 2x/dag		**Week 1**	**Week 2**	**Week 3**	**Week 4**
. . . . . mg 's ochtends		✔	✔	✔	✔
. . . . . mg 's avonds		✔	✔	✔	✔

Inname

- Acalabrutinib wordt tweemaal per dag ingenomen met 12 uur tussen beide innames.
- Acalabrutinib mag zowel met als zonder voeding worden ingenomen. Je neemt de medicatie best op een consequente manier in:
  - ofwel steeds op een lege maag: dit betekent doorgaans niet eten vanaf 2 uur voor de inname tot 1 uur na de inname van acalabrutinib
  - ofwel steeds bij een maaltijd of ten laatste 30 minuten na de maaltijd.
- Interactie met voeding: vermijd tijdens de inname van acalabrutinib het eten van preparaten op basis van sint-janskruid.
- Interactie met medicatie: pijnmedicatie op basis van aspirine en ontstekingswerende medicatie zoals ibuprofen kan je tijdens de behandeling met acalabrutinib beter vermijden omdat ze het risico op een bloeding verhogen. Bespreek het met je behandelende arts als je die medicijnen regelmatig gebruikt. Paracetamol kan je veilig gebruiken als pijnmedicatie.

Wat als?

Als je een dosis acalabrutinib bent vergeten, kan je de vergeten dosis inhalen tot 3 uur na het geplande tijdstip. Wanneer er meer dan 3 uur is na de geplande tijdstip, dan sla je de vergeten dosis over en neem je volgende dosis op het geplande tijdstip. Neem geen dubbele dosis om de vergeten dosis in te halen. Meld een vergeten dosis bij je volgende ziekenhuisbezoek.

Algemene richtlijnen rond de inname, bewaring en manipulatie en wat je het best doet als zich bepaalde situaties voordoen, kan je vinden in de *Gids bij je oncologische behandeling met tabletten of capsules*.

AANDACHTSPUNTEN BIJ ACALABRUTINIB

- Acalabrutinib kan mogelijk een invloed hebben op je hartritme. Neem contact op met je behandelende arts als je pijn op de borstkas of hartkloppingen ervaart.
- Als je last krijgt van hoesten of kortademigheid bij geringe inspanning, neem dan contact op met je behandelende arts.
- Acalabrutinib veroorzaakt soms griepachtige verschijnselen zoals spier- en gewrichtspijn. Als je daar veel last van hebt, mag je tot maximaal 4 keer 1 gram paracetamol innemen tegen de pijn. Meet wel vooraf je lichaamstemperatuur om na te gaan of je geen koorts hebt.
- Meld het aan je behandelende arts als je nieuwe huidletsels opmerkt.
- Door de inname van acalabrutinib kan je sneller en makkelijker blijven bloeden. Overleg met je behandelende arts als je een ingreep nodig hebt, bijvoorbeeld het trekken van een tand. Afhankelijk van de ingreep zal de inname van acalabrutinib 3 dagen vóór en na de ingreep stopgezet worden.



NEVENWERKINGEN VOORKOMEN (zie gids)

Bescherm jezelf tegen een aantal nevenwerkingen door:

- Infecties voorkomen
- Mondhygiëne en mondspoeling
- Huidverzorging
- Wondjes voorkomen
- Rust en beweging
- Voorgeschreven medicatie innemen
- Voldoende drinken

Bij jouw behandeling zijn ook de volgende adviezen belangrijk om nevenwerkingen te voorkomen:

- ~~Bloeddruk meten~~
- Hand- en ~~voetverzorging~~
- ~~Nagelbescherming~~



NEVENWERKINGEN OPVOLGEN, TIJDIG MELDEN EN BESPREKEN

Volg je klachten goed op, meld en bespreek ze tijdig met je zorgverleners. Je kan je klachten opvolgen aan de hand van een papieren of elektronisch dagboek. Je leest er meer over in de gids. Ervaar je ernstige of aanhoudende klachten of je bent ongerust over bepaalde klachten, aarzel dan niet je zorgverleners in het ziekenhuis of je huisarts te contacteren. 'Alarmsignalen' en contactgegevens vind je in de gids.



MOGELIJKE NEVENWERKINGEN AANPAKKEN (zie gids)

Bij jouw behandeling kunnen zich de volgende nevenwerkingen of klachten voordoen:

- Buikloop of diarree
- Huidveranderingen zoals:
  - Droge huid, schilfering, jeuk, huiduitslag
  - ~~Huiduitslag in de vorm van puistjes~~
  - ~~Huidveranderingen aan de handpalmen en voetzolen~~
- Misselijkheid en braken
- ~~Smaak- en geurveranderingen~~
- ~~Mondslijmvliesontsteking (aften)~~
- Een verminderd aantal witte bloedcellen
- Een verminderd aantal rode bloedcellen
- Een verminderd aantal bloedplaatjes
- ~~Haarveranderingen~~
- ~~Nagelveranderingen~~
- Verstopping
- Verhoogde bloeddruk
- ~~Tintelingen en vreemd gevoel~~
- Spier- en gewrichtspijn
- Ongewone vermoeidheid
- Gevoelens van angst, boosheid en verdriet
- Invloed op de seksualiteit en vruchtbaarheid

© UZ Leuven | 701465_v112026