UZ LEUVEN

Je therapie: pemigatinib (Pemazyre®)

DEZE BIJLAGE HOORT BIJ DE *GIDS BIJ JE ONCOLOGISCHE BEHANDELING MET TABLETTEN OF CAPSULES.*

WAT IS DE SAMENSTELLING VAN DEZE THERAPIE?

De therapie bestaat uit een celremmend geneesmiddel, namelijk pemigatinib. Pemigatinib is een doelgerichte therapie. Het blokkeert specifieke eiwitten die betrokken zijn bij de ontwikkeling en groei van kankercellen. Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Die dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om de bijwerkingen te beperken.

HOE VERLOOPT DE THERAPIE?

- Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. Eén cyclus duurt drie weken (21 dagen). Pemigatinib wordt dagelijks ingenomen gedurende 14 dagen, gevolgd door één week rust.
- Je komt naar het dagziekenhuis voor een bloedafname, een klinisch onderzoek en een voorraad tabletten. Je neemt de tabletten thuis verder in.
- Pemigatinib bestaat in tabletten van 4,5 mg, 9 mg en 13,5 mg. Je arts of verpleegkundige vertelt je welke dosis je dagelijks moet nemen. Afhankelijk van de ernst van de nevenwerkingen die je ondervindt, is een dosisverlaging mogelijk.

Pemigatinib (Pemazyre®)	Week 1	Week 2	Week 3
1 x per dag . . . . . mg  of 	✔	✔	✗

Inname

- Pemigatinib wordt één keer per dag ingenomen, steeds rond hetzelfde tijdstip.
- Pemigatinib mag zowel met als zonder voeding worden ingenomen. Je neemt de medicatie best op een consequente manier in:
  - ofwel steeds op een lege maag: dit betekent doorgaans niet eten vanaf 2 uur voor de inname tot 1 uur na de inname van pemigatinib
  - ofwel steeds bij een maaltijd of ten laatste 30 minuten na de maaltijd.
- Interactie met voeding: vermijd tijdens de inname van pemigatinib het eten of drinken van pompelmoes(sap) of preparaten op basis van sint-janskruid.

Wat als?

Als je een dosis pemigatinib bent vergeten en je merkt dit op binnen de 4 uur, dan kan je de vergeten dosis inhalen. Merk je de vergeten dosis pas veel later op (meer dan 4 uur na de geplande inname), dan sla je de vergeten dosis over en neem je de volgende dosis op het geplande tijdstip. Neem geen twee dosissen op één dag. Meld een vergeten dosis bij je volgende ziekenhuisbezoek.

Algemene richtlijnen rond de inname, bewaring en manipulatie en wat je het best doet als zich bepaalde situaties voordoen, kan je vinden in de *Gids bij je oncologische behandeling met tabletten of capsules.*

AANDACHTSPUNTEN BIJ PEMIGATINIB

- Soms krijg je door de inname van deze medicijnen last van wazig zicht, droge of rode ogen, zwarte vlekjes of lichtflitsen. Om deze reden ga je voor de start van de behandeling naar de oogarts. Neem contact op met je behandelende arts als je een van die symptomen ervaart.
- Pemigatinib veroorzaakt soms gewrichtspijn. Als je daar last van hebt, mag je tot maximaal 4x per dag 1 gram paracetamol (Dafalgan®) innemen. Meet vooraf je lichaamstemperatuur om na te gaan of je geen koorts hebt.

- Door de inname van pemigatinib is het mogelijk dat er nagelveranderingen ontstaan. Zo kunnen je nagels brozer worden, splijten, afbrokkelen, loslaten of verkleuren. Ook de nagelriemen kunnen ontstoken raken: ze worden rood, gezwollen en kunnen pijnlijk zijn. Dit kan zowel aan de handen als aan de voeten voorkomen.
  - ✔ Voorkom extra schade en ontstekingen
    - Draag extra zorg voor je handen en in het bijzonder je nagels. Zorg voor een goed nagelhygiëne om infecties te voorkomen.
    - Vermijd contact met irriterende producten en voorkom verwondingen door handschoenen te dragen bij bepaalde activiteiten.
    - Gekwetste nagels blijven makkelijker haperen aan allerlei zaken en veroorzaken dan nog meer pijn. Om dat te vermijden, kun je handschoenen dragen of kan je kleine verbandjes over je nagels kleven.
    - Houd je nagels goed kort en vijl ze regelmatig in één richting (niet heen en weer). Anders kunnen je nagels gemakkelijker scheuren.
    - Gebruik liever geen kunstnagels. De lijm kan je nagels beschadigen.
    - De nagelriem kan over de nagels groeien; Duw je nagelriemen niet terug.
    - Bijt niet op je nagels of aan de velletjes van de nagelriemen.
    - Heb je een infectie aan de nagels of een nagelriemontsteking, dan kan een ontsmettend vingerbadje met chloramine verzachtend zijn. Chloramine vind je bij de apotheker.



NEVENWERKINGEN VOORKOMEN (zie gids)

Bescherm jezelf tegen een aantal nevenwerkingen door:

- Infecties voorkomen
- Mondhygiëne en mondspoeling
- Huidverzorging
- Wondjes voorkomen
- Rust en beweging
- Voorgeschreven medicatie innemen
- Voldoende drinken

Bij jouw behandeling zijn ook de volgende adviezen belangrijk om nevenwerkingen te voorkomen:

- ~~Bloeddruk meten~~
- Hand- en voetverzorging
- ~~Nagelbescherming~~



NEVENWERKINGEN OPVOLGEN, TIJDIG MELDEN EN BESPREKEN

Volg je klachten goed op, meld en bespreek ze tijdig met je zorgverleners. Je kan je klachten opvolgen aan de hand van een papieren of elektronisch dagboek. Je leest er meer over in de gids. Ervaar je ernstige of aanhoudende klachten of je bent ongerust over bepaalde klachten, aarzel dan niet je zorgverleners in het ziekenhuis of je huisarts te contacteren. 'Alarmsignalen' en contactgegevens vind je in de gids.



MOGELIJKE NEVENWERKINGEN AANPAKKEN (zie gids)

Bij jouw behandeling kunnen zich de volgende nevenwerkingen of klachten voordoen:

- Buikloop of diarree
- Huidveranderingen zoals:
  - Droge huid, schilfering, jeuk, huiduitslag
  - ~~Huiduitslag in de vorm van puistjes~~
  - Huidveranderingen aan de handpalmen en voetzolen
- Misselijkheid en braken
- Smaak- en geurveranderingen
- Mondslijmvliesontsteking (aften)
- Ongewone vermoeidheid
- Gevoelens van angst, boosheid en verdriet
- Invloed op de seksualiteit en vruchtbaarheid
- ~~Een verminderd aantal witte bloedcellen~~
- ~~Een verminderd aantal rode bloedcellen~~
- ~~Een verminderd aantal bloedplaatjes~~
- Haarveranderingen *haarverdunning*
- Nagelveranderingen
- Verstopping
- ~~Verhoogde bloeddruk~~
- ~~Tintelingen en voos gevoel~~
- ~~Spierpijn~~
- Gewrichtpijn

© UZ Leuven | 701530_v112026