

Je therapie: sacituzumab govitecan (Trodelvy®)

DEZE BIJLAGE HOORT BIJ DE GIDS BIJ JE BEHANDELING MET CHEMOTHERAPIE.

WAT IS DE SAMENSTELLING VAN DEZE THERAPIE?

Trodelvy® combineert twee geneesmiddelen in één therapie, namelijk **sacituzumab** en **govitecan**. Govitecan is een krachtige chemotherapie die invloed heeft op de celdeling en die kankercellen vernietigt. Sacituzumab helpt om govitecan beter tot bij en in de kankercellen te brengen. Daarnaast kunnen er nog andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Die dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om nevenwerkingen te beperken.

HOE VERLOOPT DE THERAPIE?

Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. Eén cyclus duurt **drie weken (21 dagen)** en omvat **twee dagopnames** voor therapie. Dag 1 is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus. De volgende cyclus start in principe drie weken na dag 1, als de bloedsuitslagen en je algemene toestand dit toelaten.

Generieke naam	Merknaam	Dag						Wijze van toediening
		1	2	3-4	5-7	8	9-21	
Sacituzumab govitecan	Trodelvy®	•				•		Cyclus 1: infuus over 3 uur Vanaf de 2e cyclus: infuus over 90 minuten
Ondersteunende medicatie								
Filgrastim 480 mcg	Accofil®			•				Onderhuidse inspuiting

ONDERSTEUNENDE MEDICATIE

- De arts zal je bijkomend een **inspuiting met filgrastim 480 mcg** voorschrijven. Een thuisverpleegkundige zal deze inspuiting op **dag 3 en dag 4** geven, 48 en 72 uur na toediening van je therapie. Deze inspuiting gaat de aanmaak van witte bloedcellen stimuleren.
- Op de dag van de therapie neem je 30 minuten vóór de toediening van sacituzumab govitecan 1 gram paracetamol (Dafalgan®) en 1 tablet cetirizine (Zyrtec®) 10 mg in. Deze medicatie wordt gegeven om een mogelijke infuusreactie te voorkomen.
- Door je therapie zou je een gevoel van misselijkheid en/of braken kunnen ervaren. Om dit te voorkomen neem je, vóór de toediening van sacituzumab govitecan, 1 capsule Akynzeo® in. Je krijgt ook 10 mg Aaxidecam® toegediend via de bloedbaan.

WAAR WORDT DE THERAPIE TOEGEDIEND?

Je behandeling met sacituzumab govitecan vindt plaats via het oncologisch dagziekenhuis. Een overnachting is doorgaans niet nodig.

AANDACHTSPUNTEN BIJ SACITUZUMAB GOVITECAN

- Een infuusreactie doet zich zelden voor. Als ze toch voorkomt, is dat meestal tijdens de eerste toediening terwijl je nog in het ziekenhuis bent. Een infuusreactie kenmerkt zich door huiduitslag, al dan niet in combinatie met jeuk (eventueel over heel het lichaam), een gevoel van benauwdheid, lage bloeddruk, koorts of rillingen. Soms gaat een reactie gepaard met een gevoel van misselijkheid of met overmatig transpireren. Het is belangrijk dat je dergelijke gewaarwordingen onmiddellijk meldt aan de verpleegkundige of arts, zodat er vlug en adequaat kan worden gereageerd.
- De therapie kan hoofdpijn en gewrichtspijn veroorzaken. Je mag daarvoor paracetamol 1 gram innemen, maximaal vier keer per dag. Controleer daarvoor best eerst je lichaamstemperatuur om te controleren of je koorts hebt.



NEVENWERKINGEN VOORKOMEN (zie gids)

Bescherm jezelf tegen een aantal nevenwerkingen door:



Infecties voorkomen



Mondhygiëne en
mondspoeling



Huidverzorging



Wondjes voorkomen



Rust en beweging



Voorgeschreven
medicatie innemen



Voldoende drinken

Bij jouw behandeling zijn ook de volgende adviezen belangrijk om nevenwerkingen te voorkomen:



Hand- en voetverzorging




Koude voeding en dranken vermijden



Nagelverzorging



Een alternatief (pruik, sjaaltje ...) voorzien



NEVENWERKINGEN OPVOLGEN, TIJDIG MELDEN EN BESPREKEN

Volg je klachten goed op, meld en bespreek ze tijdig met je zorgverleners. Je kan je **klachten opvolgen** aan de hand van een **papieren of elektronisch dagboek**. Je leest er meer over in de gids. Ervaar je ernstige of aanhoudende klachten of je bent ongerust over bepaalde klachten, aarzel dan niet je zorgverleners in het ziekenhuis of je huisarts te contacteren. 'Alarmsignalen' en **contactgegevens** vind je in de gids.



MOGELIJKE NEVENWERKINGEN AANPAKKEN (zie gids)

Een verminderd aantal witte bloedcellen
Een verminderd aantal rode bloedcellen
~~Een verminderd aantal bloedplaatjes~~

Misselijkheid en braken
Smaak- en geurveranderingen
Mondslijmvliesontsteking (bv. aften)

Ongewone vermoeidheid
Invloed op de seksualiteit en vruchtbaarheid
Gevoelens van angst, boosheid en verdriet

Bij jouw behandeling kunnen zich ook de volgende nevenwerkingen voordoen:

- Buikloop of diarree
- Verstopping
- Haarverlies
- Huidveranderingen
- ~~Handvoetsyndroom~~
- ~~Nagelveranderingen~~
- ~~Ooglast~~
- ~~Oorsuizen en verminderd gehoor~~
- ~~Grieperig gevoel~~
- ~~Tintelingen of voos gevoel in vingertoppen en/of tenen~~