



Starten met vedolizumab

informatie voor patiënten

INLEIDING	3
WAT IS VEDOLIZUMAB?	4
MOET IK NUCHTER ZIJN VOOR EEN BEHANDELING MET VEDOLIZUMAB?	4
WAT MOET ER GEBEUREN VOOR DE OPSTART VAN DE BEHANDELING MET VEDOLIZUMAB?	4
ZWANGERSCHAP EN VACCINATIES	5
BEHANDELING MET VEDOLIZUMAB	5
Intraveneuze toediening (infuus)	
Subcutane toediening (spuit of pen)	
NEVENWERKINGEN	9
TIPS	9
NOG VRAGEN?	10

Uw arts heeft u een behandeling met vedolizumab (Entyvio®) voorgeschreven. In deze brochure geven wij u graag meer informatie over dit geneesmiddel.

De keuze voor een intraveneuze (via een infuus) of subcutane therapie (via een spuit of pen) met vedolizumab wordt in overleg met de arts bepaald. Er wordt steeds gestart met intraveneuze therapie. Enkel na positief advies van de arts kunt u overschakelen naar subcutane therapie, maar dat is niet voor elke patiënt mogelijk.

WAT IS VEDOLIZUMAB (ENTYVIO®)?

Entyvio® is een biologisch geneesmiddel van de klasse anti-integrines of adhesieremmers. De actieve stof, vedolizumab, verhindert selectief dat de witte bloedcellen vanuit de bloedbaan naar de darm trekken door een eiwit (integrine) op het oppervlak van de witte bloedcellen te blokkeren. Entyvio® is met andere woorden een darmselectieve immunosuppressieve behandeling en kan gebruikt worden voor de behandeling van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.

MOET IK NUCHTER ZIJN VOOR EEN BEHANDELING MET VEDOLIZUMAB?

U moet niet nuchter zijn voor een behandeling met vedolizumab.

WAT MOET ER GEBEUREN VOOR DE OPSTART VAN DE BEHANDELING MET VEDOLIZUMAB?

Eerst worden een longfoto (RX-thorax) en huidtest (intradermo) uitgevoerd om een vroegere blootstelling aan tuberculose uit te sluiten. Daarna zal uw arts of de IBD-verpleegkundige samen met u uw vaccinaties nakijken.

ZWANGERSCHAP EN VACCINATIES

Tijdens de zwangerschap mag vedolizumab verder toegediend worden, tenzij de arts dit afraadt of in overleg wordt beslist om met de behandeling te stoppen. Als u vedolizumab krijgt terwijl u zwanger bent, is het belangrijk om dit na de geboorte te vertellen aan de arts van uw kindje voordat uw baby een vaccin krijgt. Uw kind mag de eerste twaalf maanden na de geboorte geen 'levend vaccin' krijgen, zoals het Rotavaccin.

BEHANDELING MET VEDOLIZUMAB

INTRAVENEUZE TOEDIENING (INFUUS)

Inschrijven

U moet zich altijd inschrijven in de ontvangsthal van het ziekenhuis (toegang Oost). U krijgt vervolgens een identificatiebandje om met uw persoonlijke gegevens. Daarna kunt u de Bruine straat volgen tot aan poort 6, niveau 4. Daar vindt u dagziekenhuis 11.

Belangrijk

- Als u niet naar uw afspraak kunt komen, verwittig dan tijdig de infuuseenheid via tel. 016 34 51 91. Zo kunnen wij een andere patiënt verder helpen.
- Tijdens de behandeling mag u de infuuseenheid niet verlaten.
- Er is internettoegang voorzien.
- In normale omstandigheden kunt u nadien zelf naar huis rijden.
- Gelieve de mynexuzhealth-vragenlijst ten laatste 48 uur op voorhand in te vullen.

Behandelingschema

Als vedolizumab intraveneus wordt gegeven, via een infuus in de bloedbaan, gebeurt dat tijdens een dagopname in het ziekenhuis. Zowel voor de ziekte van Crohn als voor colitis ulcerosa bedraagt de dosis steeds 300 mg per infuus, onafhankelijk van uw gewicht of de ernst van uw ziekte. Na een eerste toediening van vedolizumab volgt er één na twee weken en één na zes weken. Als u goed reageert, krijgt u daarna een infuus om de acht weken.

Standaard dosering



Hoelang duurt een infuus?

De toediening zelf duurt ongeveer 30 minuten. Gemiddeld bent u 1,5 uur in het dagziekenhuis voor deze toediening.

De verschillende stappen van de behandeling

- Stap 1:** Het navragen van de symptomen. De verpleegkundige begeleidt u naar uw zetel en stelt u enkele algemene vragen. Ze vraagt onder meer of u op voorhand de online vragenlijst via mynexuzhealth hebt ingevuld en doorgestuurd. Op deze manier wint u tijd.
- Stap 2:** Meten van de parameters: bloeddruk, pols, temperatuur, gewicht.
- Stap 3:** Bloedafname (met minstens één keer per jaar een controle van de vedolizumab-bloedwaarde)
- Stap 4:** Prikken van het infuus en toediening van vedolizumab.
- Stap 5:** Verwijderen van het infuus en controle van de parameters.
- Stap 6:** Plannen van een nieuwe afspraak.

Bent u ziek voor, tijdens of na uw behandeling?

Bent u ziek of hebt u koorts ($> 37.8^{\circ}\text{C}$) **voor** uw behandeling?
Verwittig dan tijdig de infuuseenheid: tel. 016 34 51 91.

Krijgt u symptomen **tijdens** de behandeling, verwittig dan altijd de verantwoordelijke verpleegkundige.

Hebt u problemen **na** de behandeling? Neem dan contact op met de IBD-verpleegkundigen.

SUBCUTANE TOEDIENING (SPUIT OF PEN)

Behandelingschema

U mag enkel na overleg met de arts overschakelen naar de subcutane vorm van vedolizumab. Dat is meestal het geval wanneer u goed reageert op de infusen.

De behandeling is dezelfde voor colitis ulcerosa als voor de ziekte van Crohn. U kunt kiezen tussen een spuit of een pen. De IBD-verpleegkundige zal u aanleren hoe u die moet gebruiken. Als u zich niet zelf wil injecteren, kunnen we eventueel een familielid betrekken of thuisverpleging voor u regelen. Eén injectie bevat 108 mg vedolizumab. De spuiten of pennen worden thuis bewaard in de koelkast (2-8°C). Het normale schema is één toediening (spuit/pen) met vedolizumab om de twee weken.

Uw arts bespreekt met u of deze behandeling mogelijk is.

NEVENWERKINGEN

Omdat vedolizumab darmselectief werkt, zijn er weinig nevenwerkingen. Het nadeel is wel dat het een tijd kan duren (tot 3 maanden) vooraleer de therapie aanslaat.

TIPS

- ✓ Hebt u een afspraak bij uw arts of tandarts?
Zeg dan altijd dat u een behandeling krijgt met vedolizumab.
- ✓ Liet u een bloedafname of onderzoek doen buiten UZ Leuven? Breng dan altijd de resultaten mee naar het ziekenhuis.
- ✓ Wordt u geopereerd of moet u een specifieke ingreep ondergaan? Hebt u (verre) reisplannen? Hebt u een actieve kinderwens? Breng uw arts of uw verpleegkundige dan tijdig op de hoogte.
- ✓ Vraag naar de IBD-vaccinatiebrochure.
- ✓ Laat weten welke geneesmiddelen u precies inneemt.
Maak hier een lijstje van en noteer ook de dosis per geneesmiddel.
- ✓ Vergeet uw voorschriften/attest niet te vragen aan uw arts.

- ✓ In het geval u vedolizumab toegediend krijgt via een spuit of pen (subcutaan):
 - Probeer altijd uw medicatie correct te gebruiken zoals deze werd voorgeschreven door uw arts. Uw huisarts kan geen vedolizumab voorschrijven.
 - Plaats het spuitje best altijd op dezelfde weekdag, bijvoorbeeld altijd op donderdag om de twee weken. Een (online) dagboek kan een handig hulpmiddel zijn om uw schema en de injectieplaats bij te houden.

NOG VRAGEN?

Neem dan contact op met uw IBD-verpleegkundigen via e-mail: ibdnurse@uzleuven.be.

Voor dringende gevallen: tel. 016 34 06 21 (van 10 tot 12 uur)

© november 2023 UZ Leuven

Overname van deze tekst en illustraties is enkel mogelijk na toestemming van de dienst communicatie UZ Leuven.

Ontwerp en realisatie

Deze tekst werd opgesteld door de IBD-verpleegkundigen in samenwerking met de dienst communicatie.

U vindt deze brochure ook op www.uzleuven.be/brochure/701645.

Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kunt u bezorgen via communicatie@uzleuven.be.

Verantwoordelijke uitgever
UZ Leuven
Herestraat 49
3000 Leuven
tel. 016 33 22 11
www.uzleuven.be

 my nexuz health



Raadpleeg uw medisch dossier
via nexuzhealth.com
of download de app

