

# Richtlijnen na de **verwijdering** van een poortkatheter

Er werd een **poortkatheter** bij u **verwijderd**. Houd rekening met de volgende richtlijnen, zo verloopt uw herstel zo optimaal mogelijk.

Na de ingreep mag u zelf met de auto rijden.



## **PIJN EN ONGEMAK**

Het is mogelijk dat u in de komende dagen wat pijn of een ongemakkelijk gevoel hebt ter hoogte van de insnede. U mag hiervoor een pijnstiller nemen op basis van paracetamol, zoals Dolprone<sup>®</sup>, Dafalgan<sup>®</sup> of Perdolan Mono<sup>®</sup>.



Neem zeker geen pijnstillers op basis van acetylsalicylzuur, zoals Aspirine®, Aspro®, Aspegic®. Ze verhogen de kans op een bloeding.

## VERZORGING VAN DE WONDE

De wonde werd afgedekt met lijm. Er zijn dus geen hechtingsdraden die moeten verwijderd worden en er moet geen afdekverband gekleefd worden.

Houd de eerste 48 uur de lijm droog, daarna mag u zich douchen. Dep na het douchen de lijm ter hoogte van de wonde droog zonder over de wonde te wrijven. Als de wonde in orde is, mag u na een week weer een bad nemen en zwemmen.

Na 10 tot 14 dagen komt de lijm vanzelf los en mogen de resten verwijderd worden.

De wonde is in orde als de mogelijk aanwezige pijn, zwelling, roodheid of vochtlekkage afnemen in de dagen na de operatie. Als een of meerdere van deze symptomen echter toenemen, neem dan contact op met uw huisarts.