



Starten met risankizumab

informatie voor patiënten

INLEIDING	3
WAT IS RISANKIZUMAB?	4
VOORBEREIDING OP DE BEHANDELING	4
ATTEST	4
BEHANDELING MET RISANKIZUMAB	5
Behandelingsschema	
Intraveneuze toediening (infuus)	
Subcutane toediening (On-Body Injector)	
NEVENWERKINGEN	9
REIZEN	9
NOG VRAGEN?	10

Uw arts heeft u een behandeling met risankizumab (Skyrizi®) voorgeschreven. In deze brochure geven wij u graag wat meer informatie over dit geneesmiddel.

WAT IS RISANKIZUMAB?

Risankizumab werkt in op bepaalde onderdelen van het immuunsysteem. Het bindt zich aan het teveel aan IL-23 eiwitten. Daardoor zullen de ontsteking en de daaraan gelinkte klachten verminderen en uw levenskwaliteit verbeteren.

VOORBEREIDING OP DE BEHANDELING

Voor de start van de behandeling zal een longfoto (RX-thorax) en een huidtest (intradermo) uitgevoerd worden om een vroegere blootstelling aan tuberculose uit te sluiten. Bovendien zal de arts of de IBD-verpleegkundige samen met u uw vaccinaties nakijken.

ATTEST

Controleer of een goedgekeurd attest van risankizumab werd geregeld. Hou een kopie van het goedgekeurde attest bij en [let op de vervaldatum](#). Zo valt u zeker niet zonder medicatie.

BEHANDELING MET RISANKIZUMAB

U krijgt uw eerste drie dosissen risankizumab via een intraveneus infuus, en dit om de vier weken. Vervolgens leert u de injecties zelf te zetten met een On-Body Injector, die u om de acht weken toedient. De IBD-verpleegkundige zal u aanleren hoe u deze medicatie onderhuids bij uzelf kunt toedienen.

BEHANDELINGSSHEMA

	Intraveneuze infusie	Lichaamsinjectie
Plaats van toediening	In het ziekenhuis	Thuis of in het ziekenhuis
Wijze van toediening	Intraveneus infuus (via een ader)	Subcutane injectie (onder de huid met de On-Body Injector)
Frequentie	Drie infusen toegediend om de vier weken	Om de acht weken
Toedieningsduur van de dosis	Minstens één uur	Tot vijf minuten
Dosisgrootte	600 of 1200 mg	180 of 360 mg



Intraveneus infuus

Plaats van toediening: in het ziekenhuis

Wijze van toediening: via een ader

Frequentie: drie infusen toegediend om de vier weken

Toedieningsduur van de dosis: minstens één uur

Dosisgrootte: 600 of 1200 mg

Doel: de behandeling opstarten aan een hogere dosis, waarvoor een intraveneus infuus in het ziekenhuis nodig is



Lichaamsinjectie

Plaats van toediening van de dosis: thuis of in het ziekenhuis


Wijze van toediening: onderhuids

Frequentie: om de acht weken

Toedieningsduur van de dosis: tot vijf minuten

Dosisgrootte: 180 of 360 mg

Doel: met de On-Body Injector is behandeling thuis mogelijk



INTRAVENEUZE TOEDIENING (INFUUS)

Inschrijven

U moet zich altijd inschrijven in de ontvangsthal aan toegang Oost van het ziekenhuis. U krijgt vervolgens een polsbandje met uw persoonlijke gegevens. Daarna kunt u de Bruine straat volgen tot aan poort 6, waar u de lift neemt. Dagziekenhuis 11 bevindt zich op niveau 4.

Belangrijk

- Als u niet naar uw afspraak kunt komen, verwittigt dan tijdig de infuuseenheid via tel 016 34 45 26. Zo kunnen wij een andere patiënt verder helpen en voor u een alternatief zoeken.

- Tijdens de behandeling mag u de infuuseenheid niet verlaten.
- Er is internettoegang voorzien.
- In normale omstandigheden kunt u nadien zelf naar huis rijden.
- Gelieve de mynexuzhealth-vragenlijst ten laatste 48 uur op voorhand in te vullen.
- U kunt voorschriften en attesten verkrijgen via mynexuzhealth.

De verschillende stappen van de behandeling

- Stap 1:** Het navragen van de symptomen. De verpleegkundige begeleidt u naar uw zetel en stelt u enkele algemene vragen. Ze vraagt onder meer of u op voorhand de online vragenlijst via mynexuzhealth hebt ingevuld en doorgestuurd. Op deze manier wint u tijd.
- Stap 2:** Meten van de parameters: bloeddruk, pols, temperatuur, gewicht.
- Stap 3:** Bloedafname.
- Stap 4:** Prikken van het infuus en toediening van risankizumab.
- Stap 5:** Verwijderen van het infuus en controle van de parameters.
- Stap 6:** Plannen van een nieuwe afspraak.

Bent u ziek voor, tijdens of na uw behandeling?

Bent u ziek of hebt u koorts ($> 37.8^{\circ}\text{C}$) **voor** uw behandeling?
Verwittig dan tijdig de infuuseenheid: tel. 016 34 45 26.

Krijgt u symptomen **tijdens** de behandeling, verwittig dan altijd de verantwoordelijke verpleegkundige.

Hebt u problemen **na** de behandeling? Neem dan contact op met de IBD-verpleegkundigen.

SUBCUTANE TOEDIENING (ON-BODY INJECTOR)

U schakelt na 3 infuzen over naar de subcutane vorm van risankizumab, met behulp van een On-Body Injector (OBI).
De IBD-verpleegkundige zal u aanleren hoe u die moet gebruiken.
Als u zich niet zelf wil injecteren, kunnen we eventueel een familielid inschakelen of thuisverpleging voor u regelen.

Eén injectie bevat 180 of 360 mg risankizumab. De OBI bewaart u thuis in de koelkast ($2-8^{\circ}\text{C}$). De medicatie mag niet bevriezen. Buiten de koelkast kan dit medicijn 24 uur bewaard blijven (tot maximaal 25°C). Haal de OBI 45 minuten voor toediening uit de koelkast.

Het standaardschema is één toediening met de OBI om de 8 weken. Het is belangrijk dat u dit schema goed volgt. De toediening gebeurt bij voorkeur op een rustig moment, waarop u zo min mogelijk beweegt.

NEVENWERKINGEN

Zoals bij elk medicijn kunnen er nevenwerkingen optreden. Mogelijke maar zeer zeldzame nevenwerkingen zijn:

- Koorts, griepachtige klachten;
- Infecties van de bovenste luchtwegen;
- Vermoeidheid;
- Schimmelinfectie op de huid;
- Reacties op de injectieplaats (zoals roodheid of pijn);
- Jeuk;
- Hoofdpijn

REIZEN

Heeft u reisplannen? Bespreek die dan tijdig met uw arts of IBD-verpleegkundige.

NOG VRAGEN?

Neem dan contact op met uw IBD-verpleegkundigen via e-mail:
ibdnurse@uzleuven.be.

Voor dringende gevallen: tel. 016 34 06 21 (van 10 tot 12 uur)

© april 2025 UZ Leuven

Overname van deze tekst en illustraties is enkel mogelijk na toestemming van de dienst communicatie UZ Leuven.

Ontwerp en realisatie

Deze tekst werd opgesteld door de IBD-verpleegkundigen in samenwerking met de dienst communicatie.

U vindt deze brochure ook op www.uzleuven.be/brochure/701824.

Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kunt u bezorgen via communicatie@uzleuven.be.

Verantwoordelijke uitgever
UZ Leuven
Herestraat 49
3000 Leuven
tel. 016 33 22 11
www.uzleuven.be

 my nexuz health



Raadpleeg uw medisch dossier
via nexuzhealth.com
of download de app

