

# Je therapie: trastuzumab - deruxtecan (Enhertu<sup>®</sup>) (REO)

DEZE BIJLAGE HOORT BIJ DE 'GIDS BIJ JE BEHANDELING MET CHEMOTHERAPIE'.

## WAT IS DE SAMENSTELLING VAN DEZE THERAPIE?

Enhertu<sup>®</sup> (ook bekend als T-DXd) combineert twee geneesmiddelen in één therapie, namelijk **trastuzumab** en **deruxtecan**.

**Trastuzumab** is een doelgerichte therapie die zich specifiek bindt aan de HER2-receptor op kankercellen. Dit helpt de groei van kankercellen te remmen.

Zodra trastuzumab zich aan de HER2-receptor hecht, wordt het tweede geneesmiddel vrijgegeven.

Dat is **deruxtecan**. Deruxtecan vernietigt de kanker cel. De combinatie zorgt dat deruxtecan vooral in de kankercellen terecht komt, waardoor het gezonde weefsel zoveel mogelijk wordt gespaard.

## HOE VERLOOPT DE THERAPIE?

Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. Een cyclus duurt **drie weken (21 dagen)** en omvat één dagopname voor therapie. Dag 1 is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus. De volgende cyclus start in principe drie weken na dag 1, als de bloeuitslagen en je algemene toestand het toelaten.

Om het effect van de behandeling op de bloedcellen na te gaan, wordt op dag 8 en 15 van de eerste cyclus een bloedafname aanbevolen. Dit gebeurt best door de huisarts, net als de opvolging van de resultaten. Je kan hiervoor een laboformulier krijgen in het ziekenhuis. Op het formulier staat vermeld hoe de resultaten correct verstuurd kunnen worden naar UZ Leuven. Valt dit op een vrijdag, gelieve dan een dag eerder naar de huisarts te gaan. Zo zijn de resultaten tijdig gekend voor de aanvang van het weekend.

Generieke naam	Merksnaam	Dag		Wijze van toediening
		1	2-21	
Trastuzumab - deruxtecan	Enhertu <sup>®</sup>	•		1e toediening infuus over 90 minuten Als er geen infuusreactie is, bedraagt de inlooptijd vanaf de 2e toediening 30 minuten
<b>Ondersteunende medicatie</b>				
Ondansetron	Zofran <sup>®</sup>	•		Infuus, 30 minuten voor toediening van therapie
Methylprednisolon	Solu-Medrol <sup>®</sup>	•		Infuus, 30 minuten voor toediening van therapie

## WAAR WORDT DE THERAPIE TOEGEDIEND?

De behandeling gebeurt in het dagziekenhuis. Overnachting is niet nodig.

## AANDACHTSPUNTEN BIJ TRASTUZUMAB - DERUXTECAN

- Tijdens de eerste toediening van trastuzumab - deruxtecan kan het af en toe voorkomen dat iemand een **infuusreactie** of een **allergische reactie** heeft. Een allergische reactie kenmerkt zich door huiduitslag (eventueel over het ganse lichaam), een gevoel van benauwdheid, lage bloeddruk, koorts of rillingen. Soms gaat een reactie gepaard met een gevoel van misselijkheid of met overmatig transpireren. Het is belangrijk dat je dergelijke gewaarwordingen onmiddellijk meldt aan de verpleegkundige of arts, zodat er vlug en adequaat kan worden gereageerd.

- Trastuzumab - deruxtecan kan een invloed hebben op je **hartfunctie**. Je zal daarom op regelmatige tijdstippen een hartfunctieonderzoek krijgen. Meld het aan je arts als je last krijgt van kortademigheid, pijn op de borstkas of opgezwollen voeten.
- Trastuzumab - deruxtecan kan een **ontsteking ter hoogte van de longblaasjes** veroorzaken. Deze bijwerking is zeldzaam maar kan wel ernstig zijn. Symptomen kunnen zijn: hoest, kortademigheid, koorts en/of nieuwe of ergere ademhalingsymptomen. Neem direct contact op met je behandelende arts als je deze symptomen hebt, ook als deze mild zijn.



## NEVENWERKINGEN VOORKOMEN (zie gids)

Bescherm jezelf tegen een aantal nevenwerkingen door:



Infecties voorkomen



Mondhygiëne en mondspoeling



Huidverzorging



Wondjes voorkomen



Rust en beweging



Voorgeschreven medicatie innemen



Voldoende drinken

Bij jouw behandeling zijn ook de volgende adviezen belangrijk om nevenwerkingen te voorkomen:



~~Hand- en voetverzorging~~



~~Koude voeding en dranken vermijden~~



~~Nagelverzorging~~



~~Een alternatief (pruik, sjaaltje ...) voorzien~~



## NEVENWERKINGEN OPVOLGEN, TIJDIG MELDEN EN BESPREKEN

Volg je klachten goed op, meld en bespreek ze tijdig met je zorgverleners. Je kan je **klachten opvolgen** aan de hand van een **papieren of elektronisch dagboek**. Je leest er meer over in de gids. Ervaar je ernstige of aanhoudende klachten of je bent ongerust over bepaalde klachten, aarzel dan niet je zorgverleners in het ziekenhuis of je huisarts te contacteren. '**Alarmsignalen**' en **contactgegevens** vind je in de gids.



## MOGELIJKE NEVENWERKINGEN AANPAKKEN (zie gids)

Een verminderd aantal witte bloedcellen  
Een verminderd aantal rode bloedcellen  
Een verminderd aantal bloedplaatjes

Misselijkheid en braken  
Smaak- en reukveranderingen  
Mondslijmvliesontsteking (bv. aften)

Ongewone vermoeidheid  
Invloed op de seksualiteit en intimiteit  
Gevoelens van angst, boosheid en verdriet

Bij jouw behandeling kunnen zich ook de volgende nevenwerkingen voordoen:

- Buikloop of diarree
- Verstopping
- Haarverlies/haarverdunding  
*zelden volledig haarverlies*
- ~~Huidveranderingen~~
- ~~Handvoetsyndroom~~
- ~~Nagelveranderingen~~
- Ooglast
- ~~Oorsuizingen en verminderd gehoor~~
- Griepig gevoel *hoofdpijn en/of duizeligheid*
- ~~Tintelingen of voos gevoel in vingertoppen en/of tenen~~