

Je therapie: ivosidenib (Tibsovo[®])

(DIO)

DEZE BIJLAGE HOORT BIJ DE GIDS BIJ JE ONCOLOGISCHE BEHANDELING MET TABLETTEN OF CAPSULES.

WAT IS DE SAMENSTELLING VAN DEZE THERAPIE?

De therapie bestaat uit één celremmend geneesmiddel, namelijk **ivosidenib**. Ivosidenib is een doelgerichte therapie. Het blokkeert specifieke eiwitten die betrokken zijn bij de ontwikkeling en groei van kankercellen. Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Die dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om de bijwerkingen te beperken.

HOE VERLOOPT DE THERAPIE?

- Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van 1 cyclus van de therapie. Eén cyclus duurt **4 weken** (28 dagen).
- Op dag 1 van elke cyclus kom je naar het dagziekenhuis oncologie of de raadpleging voor een bloedafname, een klinisch onderzoek en een (nieuwe) voorraad capsules. Je neemt de capsules thuis verder in.
- Ivosidenib bestaat in capsules van 250 mg. Je arts of verpleegkundige vertelt je welke dosis je dagelijks moet nemen. Afhankelijk van de ernst van eventuele nevenwerkingen die je ondervindt, is een dosisverlaging mogelijk.

Ivosidenib (Tibsovo [®])	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4
1x per dag mg 	✓	✓	✓	✓

Inname

- Ivosidenib wordt **één keer per dag** ingenomen, steeds rond hetzelfde tijdstip.
- Ivosidenib wordt steeds op een **nuchtere maag** ingenomen, dit wil zeggen:
 - Ofwel 2 uur vooraf niet meer eten op het moment dat je de dosis Ivosidenib inneemt.
 - Ofwel na de inname van ivosidenib 1 uur wachten vooraleer je weer eet.
- **Interactie met voeding of andere voedingssupplementen:** vermijd tijdens je behandeling met ivosidenib het eten of drinken van pomelmoes(sap) en preparaten op basis van sint-janskruid.

Wat als?


Als je een dosis Ivosidenib bent vergeten, en je merkt dit op binnen de 12 uur, dan kan je **de vergeten dosis inhalen bij de volgende maaltijd of bij een tussendoortje**. Merk je de vergeten dosis pas veel later op (meer dan 12 uur na de geplande inname), dan sla je de vergeten dosis over en neem je de volgende dosis op het geplande tijdstip.

Algemene richtlijnen rond de inname, bewaring en manipulatie en wat je het best doet als zich bepaalde situaties voordoen, kan je vinden in de Gids bij je oncologische behandeling met capsules of tabletten.

AANDACHTSPUNTEN BIJ IVOSIDENIB

- Ivosidenib kan een invloed hebben op je **hartritme**. Je arts zal regelmatig een hartfunctieonderzoek (ECG) laten uitvoeren. Neem contact op met je behandelende arts als je pijn op je borstkas, hartkloppingen of kortademigheid ervaart.

- Door ivosidenib kan je last krijgen van **hoofdpijn en duizeligheid**. Als je last hebt van hoofdpijn mag je tot 4 maal per dag 1 gram paracetamol innemen. Meet best eerst je lichaamstemperatuur om na te gaan of je geen koorts hebt.



NEVENWERKINGEN VOORKOMEN (zie gids)

Bescherm jezelf tegen een aantal nevenwerkingen door:



Infecties voorkomen



Mondhygiëne en mondspoeling



Huidverzorging



Wondjes voorkomen



Rust en beweging



Voorgeschreven medicatie innemen



Voldoende drinken

Bij jouw behandeling zijn ook de volgende adviezen belangrijk om nevenwerkingen te voorkomen:




Bloeddruk meten



Hand- en voetverzorging



Nagelbescherming



NEVENWERKINGEN OPVOLGEN, TIJDIG MELDEN EN BESPREKEN

Volg je klachten goed op, meld en bespreek ze tijdig met je zorgverleners. Je kan je **klachten opvolgen** aan de hand van een **papieren of elektronisch dagboek**. Je leest er meer over in de gids. Ervaar je ernstige of aanhoudende klachten of je bent ongerust over bepaalde klachten, aarzel dan niet je zorgverleners in het ziekenhuis of je huisarts te contacteren. 'Alarmsignalen' en **contactgegevens** vind je in de gids.



MOGELIJKE NEVENWERKINGEN AANPAKKEN (zie gids)

Bij jouw behandeling kunnen zich de volgende nevenwerkingen of klachten voordoen:

- Buikloop of diarree
- Huidveranderingen zoals:
 - Droge huid, schilfering, jeuk, huiduitslag
 - ~~Huiduitslag in de vorm van puistjes~~
 - ~~Huidveranderingen aan de handpalmen en voetzolen~~
- Misselijkheid en braken
- Smaak- en reukveranderingen
- Mondslijmvliesontsteking (aften)
- Ongewone vermoeidheid
- Gevoelens van angst, boosheid en verdriet
- Invloed op de seksualiteit en vruchtbaarheid
- Een verminderd aantal witte bloedcellen
- Een verminderd aantal rode bloedcellen
- Een verminderd aantal bloedplaatjes
- ~~Haarveranderingen~~
- ~~Verstopping~~
- ~~Verhoogde bloeddruk~~
- Tintelingen en voos gevoel
- ~~Spier- en gewrichtspijn~~