

Je therapie: tislelizumab (Tivimbra®)

DEZE BIJLAGE HOORT BIJ DE GIDS BIJ JE BEHANDELING MET IMMUNOTHERAPIE.

WAT IS DE SAMENSTELLING VAN DEZE THERAPIE?

De therapie bestaat uit één celremmend geneesmiddel, namelijk **tislelizumab**. Tislelizumab is immuuntherapie en helpt het immuunsysteem om kankercellen beter te herkennen en aan te vallen.

Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Die dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om de bijwerkingen te beperken.

HOE VERLOOPT DE THERAPIE?

Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie:

- Een cyclus duurt **3 weken (21 dagen)** en omvat **1 dagopname** voor therapie.
- Dag 1 is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus. De volgende cyclus start in principe drie weken na dag 1, als de bloedsuitslagen en je algemene toestand dit toelaten.
- Je arts vertelt of je alleen met tislelizumab wordt behandeld (monotherapie). Mogelijk wordt tislelizumab gecombineerd met een andere immunotherapie of chemotherapie.

Generieke naam	Merknaam	Dag		Wijze van toediening
		1	2-21	
Tislelizumab	Tivimbra®	•		Cyclus 1 en 2: infuus over 1 uur Vanaf cyclus 3 én als de vorige toedieningen goed verdragen werden: infuus over 30 minuten

WAAR WORDT DE THERAPIE TOEGEDIEND?

Je behandeling met tislelizumab gebeurt via het oncologisch dagziekenhuis. Tijdens de eerste en tweede toediening blijf je na afloop nog 2 uur ter observatie, zodat de zorgverleners je goed kunnen opvolgen. Vanaf de derde toediening is de observatietijd 30 minuten. Een opname of een overnachting in het ziekenhuis is niet nodig.

AANDACHTSPUNTEN BIJ TISLELIZUMAB

- Een **infuusreactie** doet zich zelden voor. Als ze toch voorkomt, is dat meestal tijdens de eerste toediening terwijl je nog in het ziekenhuis bent. Een infuusreactie kenmerkt zich door huiduitslag, al dan niet in combinatie met jeuk (eventueel over heel het lichaam), een gevoel van benauwdheid, lage bloeddruk, koorts of rillingen. Soms gaat een reactie gepaard met een gevoel van misselijkheid of met overmatig transpireren. Het is belangrijk dat je dergelijke gewaarwordingen onmiddellijk meldt aan de verpleegkundige of arts, zodat er vlug en adequaat kan worden gereageerd.

- Het is erg belangrijk dat een **auto-immuunreactie** tijdig wordt vastgesteld en behandeld!



Neem daarom onmiddellijk contact op met je behandelende arts als je klachten ervaart die kunnen wijzen op een auto-immuunreactie. Welke klachten dat zijn, vind je terug in de *Gids bij je behandeling met immunotherapie*.

- Door de behandeling met tislelizumab kunnen er **afwijkingen optreden in je bloed**, zoals bloedarmoede, een verlaagd aantal witte bloedcellen of bloedplaatjes. Door deze veranderingen ben je tijdens je behandeling **vatbaarder voor infecties**. Symptomen van een infectie kunnen variëren afhankelijk van de locatie in je lichaam. Als je klachten hebt die kunnen wijzen op een infectie, raadpleeg dan je behandelende arts of huisarts. Mogelijke tekenen van een infectie zijn: temperatuur boven 38°C en/of koude rillingen, keelpijn, gevoel van kortademigheid, hoest, hoofdpijn, pijn en/of branderig gevoel bij het plassen. **Andere klachten** zoals vermoeidheid, wondjes die langer blijven bloeden of als je sneller blauwe plekken krijgt, meld je aan je zorgverleners.



NEVENWERKINGEN OPVOLGEN, TIJDIG MELDEN EN BESPREKEN

Volg je klachten goed op, meld en bespreek ze tijdig met je zorgverleners. Je kan je **klachten opvolgen** aan de hand van een **papieren of elektronisch dagboek**. Je leest er meer over in de gids. Ervaar je ernstige of aanhoudende klachten of je bent ongerust over bepaalde klachten, aarzel dan niet je zorgverleners in het ziekenhuis of je huisarts te contacteren. '**Alarmsignalen**' en **contactgegevens** vind je in de gids.



MOGELIJKE NEVENWERKINGEN AANPAKKEN (zie gids)

Bij jouw behandeling kunnen zich ook de volgende nevenwerkingen voordoen:

- Buikloop of diarree
- Huidveranderingen
- Ongewone vermoeidheid
- Misselijkheid – verminderde eetlust
- Spierpijn – gewrichtspijn
- Invloed op seksualiteit en vruchtbaarheid
- Gevoelens van angst, boosheid en verdriet