

Je therapie: Crizotinib (Xalkori®)

DEZE BIJLAGE HOORT BIJ DE GIDS BIJ JE ONCOLOGISCHE BEHANDELING MET TABLETTEN OF CAPSULES.

WAT IS DE SAMENSTELLING VAN DEZE THERAPIE?

De therapie bestaat uit één celremmend geneesmiddel, namelijk crizotinib. **Crizotinib** is een doelgerichte therapie. Het richt zich op specifieke eiwitten die de kankercellen doen groeien. Daarnaast kunnen er nog andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Die dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om bijwerkingen te beperken.

HOE VERLOOPT DE THERAPIE?

- Je komt naar de raadpleging of het dagziekenhuis voor een bloedafname, een klinisch onderzoek en een voorraad capsules. Je neemt de capsules thuis verder in.
- Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. **Eén cyclus duurt 4 weken (28 dagen).** De volgende cyclus start in principe 4 weken na dag 1, als je bloedsuitslagen en je algemene toestand dit toelaten.
- Crizotinib bestaat in **capsules** van 200 mg en 250 mg. Je behandelende arts vertelt je welke dosis je dagelijks moet innemen. Afhankelijk van de ernst van de nevenwerkingen die je ondervindt, is een dosisverlaging mogelijk.



Om het effect van de behandeling op de bloedcellen na te gaan, wordt op dag 15 van de eerste cyclus een bloedafname aanbevolen. Dit gebeurt best door de huisarts, net als de opvolging van de resultaten. Je kan hiervoor een laboformulier krijgen in het ziekenhuis. Op het formulier staat vermeld hoe de resultaten correct verstuurd kunnen worden naar UZ Leuven. Valt dit op een vrijdag, gelieve dan een dag eerder naar de huisarts te gaan. Zo zijn de resultaten tijdig gekend voor de aanvang van het weekend.

Generieke naam	Merknaam	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Wijze van inname
Crizotinib	Xalkori®	✓	✓	✓	✓	 of 

Inname

- Crizotinib wordt **twee keer per dag** ingenomen met **12 uur tussen beide innames**.
- Crizotinib wordt best systematisch op een lege maag of bij de maaltijd ingenomen.
- **Interactie met voeding:** vermijd tijdens de inname van crizotinib het eten of drinken van pompoelmoes(sap) of preparaten op basis van sint-janskruid.

Wat als?

Als je een dosis crizotinib bent vergeten, mag je de dosis inhalen als de volgende dosis minstens 6 uur later is. Als de dosis minder dan 6 uur later is, moet je de dosis overslaan en de volgende dosis op het normale tijdstip innemen. Je mag nooit een dubbele dosis innemen om een vergeten dosis in te halen. Meld een vergeten dosis bij je volgende ziekenhuisbezoek.

Algemene richtlijnen rond de inname, bewaring, manipulatie en wat je het best doet als zich bepaalde situaties voordoen, kan je vinden in de Gids bij je oncologische behandeling met tabletten of capsules.

AANDACHTSPUNTEN BIJ CRIZOTINIB

- Het kan gebeuren dat je door de inname van crizotinib **vocht opstapelt**. Daardoor kan je gewicht wat toenemen.
- Soms krijg je door de inname van deze medicatie last van **wazig zicht, droge of rode ogen** of een **ontsteking aan de ogen**. Meld dit aan je behandelende arts als je dit ervaart.
- Crizotinib kan mogelijk een **invloed hebben op je hartfunctie**. Neem contact op met je behandelende arts als je pijn of de borstkas, hartkloppingen of kortademigheid ervaart.
- Door de inname van crizotinib is je huid heel **gevoelig voor zonlicht** en kan je snel verbranden. Bescherm je tegen zonlicht en probeer zoveel mogelijk direct en indirect zonlicht te vermijden.
- Crizotinib kan een **ontsteking ter hoogte van de longblaasjes** veroorzaken. Deze bijwerking is zeldzaam maar kan wel ernstig zijn. Symptomen kunnen zijn: hoest, kortademigheid, koorts en/of nieuwe of ergere ademhalingsymptomen. Neem direct contact op met je behandelende arts als je die symptomen hebt, ook als ze mild zijn.

NEVENWERKINGEN VOORKOMEN (zie gids)

Bescherm jezelf tegen een aantal nevenwerkingen door:



Infecties voorkomen



Mondhygiëne en mondspoeling



Huidverzorging



Wondjes voorkomen



Rust en beweging



Voorgeschreven medicatie innemen



Voldoende drinken

Bij jouw behandeling zijn ook de volgende adviezen belangrijk om nevenwerkingen te voorkomen:



~~Bloeddruk meten~~



~~Hand- en voetverzorging~~



~~Nagelbescherming~~

NEVENWERKINGEN OPVOLGEN, TIJDIG MELDEN EN BESPREKEN

Volg je klachten goed op, meld en bespreek ze tijdig met je zorgverleners. Je kan je **klachten opvolgen** aan de hand van een **papieren of elektronisch dagboek**. Je leest er meer over in de gids. Ervaar je ernstige of aanhoudende klachten of je bent ongerust over bepaalde klachten, aarzel dan niet je zorgverleners in het ziekenhuis of je huisarts te contacteren. '**Alarmsignalen**' en **contactgegevens** vind je in de gids.

MOGELIJKE NEVENWERKINGEN AANPAKKEN (zie gids)

Bij jouw behandeling kunnen zich de volgende nevenwerkingen of klachten voordoen:

- Buikloop of diarree
- Huidveranderingen zoals:
 - Droge huid, schilfering, jeuk, huiduitslag
 - ~~Huiduitslag in de vorm van puistjes~~
 - ~~Huidveranderingen aan de handpalmen en voetzolen~~
- Misselijkheid en braken
- Smaak- en reukveranderingen
- Mondslijmvliesontsteking (aften)
- Een verminderd aantal witte bloedcellen
- Een verminderd aantal rode bloedcellen
- Een verminderd aantal bloedplaatjes
- ~~Haarveranderingen~~
- ~~Nagelveranderingen~~
- ~~Verstopping~~
- ~~Verhoogde bloeddruk~~
- ~~Tintelingen en voos-gevoel~~
- ~~Spier- en gewrichtspijn~~
- Ongewone vermoeidheid
- Gevoelens van angst, boosheid en verdriet
- Invloed op de seksualiteit