

Je therapie: mirvetuximab soravtansine (Elahere®)

DEZE BIJLAGE HOORT BIJ DE GIDS BIJ JE BEHANDELING MET CHEMOTHERAPIE.

WAT IS DE SAMENSTELLING VAN DEZE THERAPIE?

Elahere® combineert twee geneesmiddelen in één therapie, namelijk **mirvetuximab** en **soravtansine**.

Het eerste product bindt aan een specifiek eiwit op de kankercellen, waardoor het tweede product (de eigenlijke behandeling) heel rechtstreeks op de kankercellen kan inwerken. Soravtansine is een krachtige chemotherapie die invloed heeft op de celdeling en die kankercellen vernietigt.

Daarnaast kunnen er nog andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Die dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om de nevenwerkingen te beperken.

HOE VERLOOPT DE THERAPIE?

Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. **Eén cyclus duurt drie weken (21 dagen)** en omvat **één dagopname** voor therapie. Dag 1 is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus. De volgende cyclus start in principe drie weken na dag 1, als de bloedsuitslagen en je algemene toestand dit toelaten.

Generieke naam	Merknaam	Dag		Wijze van toediening
		1	2-28	
Mirvetuximab soravtansine	Elahere®	•		Infuus over 60-120 minuten. Tijdens de eerste toediening zal de inloopsnelheid elke 30 minuten worden verhoogd. Indien dat goed wordt verdragen, zal de tweede toediening over 60 minuten verlopen.

WAAR WORDT DE THERAPIE TOEGEDIEND?

Je behandeling met mirvetuximab soravtansine vindt plaats via het oncologisch dagziekenhuis. Een overnachting is niet nodig.

AANDACHTSPUNTEN BIJ MIRVETUXIMAB SORAVTANSINE

- Door de behandeling kan je **last krijgen van je ogen**, zoals wazig zicht, pijnlijke ogen, verslechtering van het zicht, droge en rode ogen, gevoelig aan licht, tijdelijke veranderingen aan de oppervlakte van het oog en cataract. Daarom zal vóór de start van je behandeling een oogonderzoek uitgevoerd worden. Dit zal telkens herhaald worden om de twee cycli. Ter preventie van oogproblemen raden we je aan om **4x per dag hydraterende oogdruppels (zonder conserveermiddelen) te gebruiken**, zoals Hycosan Dual®. Andere beschermingsmaatregelen zijn warmtekompresen op de ogen vóór het slapengaan en het gebruik van een zonnebril bij fel zonlicht. Maak geen gebruik van contactlenzen en beperk je schermgebruik (smartphones, tablets ...).
- Een **infuusreactie** doet zich zelden voor. Als ze toch voorkomt is dat meestal tijdens de eerste toediening terwijl je nog in het ziekenhuis bent. Een infuusreactie kenmerkt zich door huiduitslag, al dan niet in combinatie met jeuk (eventueel over heel het lichaam), een gevoel van benauwdheid, lage bloeddruk, koorts of rillingen. Soms gaat een reactie gepaard met een gevoel van misselijkheid of met overmatig transpireren. Het is belangrijk dat je dergelijke gewaarwordingen onmiddellijk meldt aan de verpleegkundige of arts, zodat er vlug en adequaat kan worden gereageerd.
- De behandeling kan een **ontsteking ter hoogte van de longblaasjes** veroorzaken. Deze bijwerking is zeldzaam maar kan wel ernstig zijn. Symptomen kunnen zijn: hoest, kortademigheid, koorts en/of

nieuwe of ergere ademhalingsproblemen. Neem direct contact op met je behandelende arts als je deze symptomen hebt, ook als ze mild zijn.

- Tijdens je behandeling met mirvetuximab soravtansine wordt je huid **extra gevoelig voor zonlicht**. Daardoor kan je sneller verbranden. Bescherm je daartegen en vermijd zoveel mogelijk direct én indirect zonlicht.
- De therapie kan **hoofdpijn en spier- en gewrichtspijn** veroorzaken. Je mag daarvoor paracetamol 1 gram innemen, maximaal vier keer per dag. Controleer daarvoor best eerst je lichaamstemperatuur om te controleren of je koorts hebt.



NEVENWERKINGEN VOORKOMEN (zie gids)

Bescherm jezelf tegen een aantal nevenwerkingen door:



Infecties voorkomen



Mondhygiëne en mondspoeling



Huidverzorging



Wondjes voorkomen



Rust en beweging



Voorgeschreven medicatie innemen



Voldoende drinken

Bij jouw behandeling zijn ook de volgende adviezen belangrijk om nevenwerkingen te voorkomen:



Hand- en voetverzorging



Koude voeding en dranken vermijden



Nagelverzorging



Een alternatief (pruik, sjaaltje ...) voorzien



NEVENWERKINGEN OPVOLGEN, TIJDIG MELDEN EN BESPREKEN

Volg je klachten goed op, meld en bespreek ze tijdig met je zorgverleners. Je kan je **klachten opvolgen** aan de hand van een **papieren of elektronisch dagboek**. Je leest er meer over in de gids. Ervaar je ernstige of aanhoudende klachten of je bent ongerust over bepaalde klachten, aarzel dan niet je zorgverleners in het ziekenhuis of je huisarts te contacteren. '**Alarmsignalen**' en **contactgegevens** vind je in de gids.



MOGELIJKE NEVENWERKINGEN AANPAKKEN (zie gids)

Een verminderd aantal witte bloedcellen
Een verminderd aantal rode bloedcellen
Een verminderd aantal bloedplaatjes

Misselijkheid en braken
~~Smaak- en geurveranderingen~~
~~Mondslijmvliesontsteking (bv. aften)~~

Ongewone vermoeidheid
Invloed op de seksualiteit en vruchtbaarheid
Gevoelens van angst, boosheid en verdriet

Bij jouw behandeling kunnen zich ook de volgende nevenwerkingen voordoen:

- Buikloop of diarree
- Verstopping
- ~~Haarverlies~~
- Huidveranderingen
- ~~Handvoetsyndroom~~
- ~~Nagelveranderingen~~
- Ooglast
- ~~Oorsuizen en verminderd gehoor~~
- Griepig gevoel
- Tintelingen of voos gevoel in vingertoppen en/of tenen