

Je therapie: fruquintinib (Fruzaqla®)

DEZE BIJLAGE HOORT BIJ DE GIDS BIJ JE ONCOLOGISCHE BEHANDELING MET TABLETTEN OF CAPSULES.

WAT IS DE SAMENSTELLING VAN DEZE THERAPIE?

De therapie bestaat uit één celremmend geneesmiddel, namelijk **fruquintinib**. Fruquintinib is een doelgerichte therapie. Het blokkeert specifieke eiwitten die mee zorgen voor de ontwikkeling en groei van kankercellen.

Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Die dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om de bijwerkingen te beperken.

HOE VERLOOPT DE THERAPIE?

- Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. Eén cyclus duurt **vier weken (28 dagen)**. De volgende cyclus start in principe vier weken na dag 1, als de bloedsuitslagen en je algemene toestand dit toelaten.
- Je komt naar het **oncologisch dagziekenhuis** of de **raadpleging** voor een bloedafname, een klinisch onderzoek en een nieuwe voorraad capsules. Je neemt de capsules thuis verder in.
- Fruquintinib wordt dagelijks ingenomen, gedurende 21 dagen. Dan volgt er één rustweek, zonder inname van de capsules.
- Fruquintinib bestaat in capsules van 1 mg en 5 mg. Je arts of verpleegkundige vertelt je welke dosis je dagelijks moet nemen. Afhankelijk van de ernst van eventuele nevenwerkingen die je ondervindt, is een dosisverlaging mogelijk.

Fruquintinib (Fruzaqla®)		Week 1	Week 2	Week 3	Week 4
1x per dag mg	 of 	✓	✓	✓	✗

Inname

- Fruquintinib wordt **één keer per dag** ingenomen.
- Je neemt de capsules steeds **rond hetzelfde tijdstip** in.
- Fruquintinib wordt systematisch **op een lege maag of bij de maaltijd** ingenomen.

Wat als?

Als je een dosis fruquintinib bent vergeten, en je merkt dit op binnen de 12 uur, dan kan je de vergeten dosis inhalen. Merk je de vergeten dosis pas veel later op (meer dan 12 uur na de geplande inname), dan sla je de vergeten dosis over en neem de volgende dosis op het geplande tijdstip. Neem geen twee dosissen op één dag. Meld een vergeten dosis bij je volgende ziekenhuisbezoek.

Algemene richtlijnen rond de inname, bewaring en manipulatie en wat je het best doet als zich bepaalde situaties voordoen, kan je vinden in de Gids bij je oncologische behandeling met tabletten of capsules.

AANDACHTSPUNTEN BIJ FRUQUINTINIB

- Fruquintinib kan je bloeddruk verhogen. Daarom wordt je bloeddruk gecontroleerd tijdens elk ziekenhuisbezoek. Het is belangrijk je bloeddruk ook thuis op te volgen. Je kan de bloeddruk noteren in het dagboekje. Zo kan je arts de evolutie goed opvolgen. Soms kan er medicatie nodig zijn om de bloeddruk te verlagen.
- Tijdens elk ziekenhuisbezoek zal je in het dagziekenhuis om een urinestaal gevraagd worden. Zo controleert je verpleegkundige het eiwitgehalte in je urine. Door je behandeling met fruquintinib kan het eiwitgehalte in je urine immers te veel verhogen.
- Door fruquintinib kan de wondgenezing vertragen. Bespreek geplande ingrepen (bijvoorbeeld aan je tanden) altijd eerst met je arts. Soms worden bepaalde ingrepen tijdens je behandeling afgeraden. Om diezelfde reden is het ook belangrijk dat je wonden toont aan je arts of verpleegkundige, zodat zij een goede verzorging kunnen geven. Bij plotse pijn, zwelling of andere abnormale klachten moet je meteen contact opnemen met je (huis)arts.
- Fruquintinib kan bloedingen veroorzaken, onder andere in het maag-darmstelsel. Neem onmiddellijk contact op met je arts bij tekenen van bloeding, zoals bloedbraken, bloed in de stoelgang of zwarte stoelgang. Meld ook hevige of aanhoudende maagpijn, koorts of koude rillingen.
- Een allergische reactie doet zich zelden voor. Een allergische reactie kenmerkt zich door huiduitslag al dan niet in combinatie met jeuk (eventueel over heel het lichaam), een gevoel van benauwdheid, lage bloeddruk, koorts of rillingen. Soms gaat een reactie gepaard met een gevoel van misselijkheid of met overmatig transpireren. Het is belangrijk dat je dergelijke gewaarwordingen onmiddellijk meld aan de verpleegkundige of arts, zodat er vlug en adequaat kan worden gereageerd.



NEVENWERKINGEN VOORKOMEN (zie gids)

Bescherm jezelf tegen een aantal nevenwerkingen door:



Infecties voorkomen



Mondhygiëne en mondspoeling



Huidverzorging



Wondjes voorkomen



Rust en beweging



Voorgeschreven medicatie innemen



Voldoende drinken

Bij jouw behandeling zijn ook de volgende adviezen belangrijk om nevenwerkingen te voorkomen:



Bloeddruk meten



Hand- en voetverzorging



Nagelbescherming



NEVENWERKINGEN OPVOLGEN, TIJDIG MELDEN EN BESPREKEN

Volg je klachten goed op, meld en bespreek ze tijdig met je zorgverleners. Je kan je [klachten opvolgen](#) aan de hand van een [papieren of elektronisch dagboek](#). Je leest er meer over in de gids. Ervaar je ernstige of aanhoudende klachten of je bent ongerust over bepaalde klachten, aarzel dan niet je zorgverleners in het ziekenhuis of je huisarts te contacteren. 'Alarmsignalen' en [contactgegevens](#) vind je in de gids.



MOGELIJKE NEVENWERKINGEN AANPAKKEN (zie gids)

Bij jouw behandeling kunnen zich de volgende nevenwerkingen of klachten voordoen:

- Buikloop of diarree
- ~~Huidveranderingen zoals:~~
 - ~~Droge huid, schilfering, jeuk, huiduitslag~~
 - ~~Huiduitslag in de vorm van puistjes~~
 - ~~Huidveranderingen aan de handpalmen en voetzolen~~
- Misselijkheid en braken
- Smaak- en reukveranderingen
- ~~Mondslijmvliesontsteking (afters)~~
- Ongewone vermoeidheid
- Gevoelens van angst, boosheid en verdriet
- Invloed op de seksualiteit en vruchtbaarheid
- Een verminderd aantal witte bloedcellen
- Een verminderd aantal rode bloedcellen
- Een verminderd aantal bloedplaatjes
- ~~Haarveranderingen~~
- ~~Verstopping~~
- Verhoogde bloeddruk
- ~~Tintelingen en voos gevoel~~
- Spier- en gewrichtspijn

