
UZ LEUVEN



Intraveneuze antibiotica-therapie met cefepim

informatie voor patiënten

INLEIDING

Je gaat naar huis na een opname op een verpleegkundige dienst en hebt nog nood aan toediening thuis van intraveneuze antibiotica ter behandeling van een bacteriële infectie.

Je wordt behandeld met cefepim. Tijdens je verblijf heeft jouw arts, de verpleegkundige of de ziekenhuisapotheker je al mondelinge informatie gegeven over jouw antibioticatherapie. Deze brochure biedt een praktisch overzicht van de antibioticatherapie met cefepim. Je vindt hier specifieke informatie over je therapie, de toediening ervan, de mogelijke bijwerkingen en enkele raadgevingen. Vervolgens zetten we op een rij in welke gevallen je je (huis)arts of (thuis)verpleegkundige moet contacteren.

De verderzetting van je intraveneuze antibioticatherapie in de thuissituatie kadert binnen het zorgprogramma OPAT. OPAT is de afkorting van de Engelse term 'Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy'. Het gaat dus om de parenterale toediening van een antimicrobieel middel zonder dat de patiënt dient opgenomen te worden in het ziekenhuis. 'Parenteraal' betekent dat de toediening niet via het maag-darmstelsel verloopt (bijvoorbeeld een tablet inslikken), maar op een andere manier, bijvoorbeeld door injectie of via een infuus.

Heb je na het lezen van deze brochure nog vragen? Aarzel dan zeker niet ze te stellen. De arts, ziekenhuisapotheker of verpleegkundigen geven je graag meer uitleg.

WAT IS CEFEPIM?

Cefepim is een antibioticum voor de behandeling van een bacteriële infectie. Het werkt bacteriedodend door de aanmaak van de celwand van de bacteriën te verstoren.

WELKE DOSIS MOET JE KRIJGEN?

Je krijgt een dosis toegediend van 6 gram cefepim per 24 uur verdeeld over drie giften.

Bij patiënten met een verminderde nierfunctie wordt de dosis aangepast op basis van de nierfunctie.

HOE WORDT CEFEPIM TOEGEDIEND?

Cefepim wordt driemaal per dag (om de 8 uur) toegediend onder de vorm van een korte intraveneuze injectie van 2 gram gedurende 3 tot 5 minuten.

De duur van de therapie is afhankelijk van het type infectie en afhankelijk van hoelang je in het ziekenhuis al antibioticatherapie heeft gekregen.

WAAR WORDT DE THERAPIE TOEGEDIEND?

De therapie wordt opgestart tijdens je verblijf in het ziekenhuis. De verderzetting van de therapie gebeurt thuis onder het zorg-programma OPAT.

Je thuisverpleegkundige zal driemaal per dag je intraveneuze injectie met antibioticatherapie komen geven via de katheter.

Meer uitgebreide informatie over de bereiding van het antibioticum wordt bezorgd aan je thuisverpleegkundige.

Het antibioticum en de nodige materialen voor de bereiding en de toediening van het antibioticum worden bij ontslag uit het ziekenhuis ter beschikking gesteld door de ziekenhuisapotheek.

In het geval van een langdurige thuisbehandeling met antibioticatherapie is het mogelijk dat niet al het materiaal voor de volledige duur van de behandeling in één keer kan meegegeven worden. Mogelijk moet je dan in de loop van je thuisbehandeling een of meerdere extra pakketten met materiaal in de ziekenhuisapotheek in UZ Leuven komen ophalen.
Dat zal duidelijk naar jou gecommuniceerd worden door het OPAT-team.

Het adres en de openingsuren van het servicepunt ziekenhuisapotheek op campus Gasthuisberg vind je op www.uzleuven.be/ziekenhuisapotheek.

HOE WORDT DE THERAPIE VERDER OPGEVOLGD?

Je maakt zelf eenmaal per week een afspraak bij je huisarts voor een bloedname.

Je behandelende arts oordeelt verder of en wanneer je opnieuw naar de raadpleging komt ter controle van de therapie, voor een bloedafname en/of voor een klinisch onderzoek.

Bij de bloedafname worden onder andere de volgende zaken gecontroleerd:

- De ontstekingswaarden in het bloed: ter controle van de therapie moeten de ontstekingswaarden in het bloed nagekeken worden.
- De nierfunctie: omdat cefepim voornamelijk via de nieren wordt uitgescheiden, moet de nierfunctie opgevolgd worden.
- De behandeling met cefepim kan invloed hebben op:
  - het aantal bloedcellen en bloedplaatjes
  - de leverfunctie

  Waarschijnlijk ondervind je daar zelf niets van. Dit wordt opgevolgd door de arts door middel van de bloedafname.

HOE MOET CEFEPIM WORDEN BEWAARD?

Niet-aangeprikte flacons van cefepim moeten bewaard worden in de originele verpakking, op kamertemperatuur (15-25 °C) en op een droge plaats, buiten het bereik van kinderen.

Oplossingen van cefepim moeten altijd bereid worden net voor de toediening ervan.

Oplossingen van cefepim kunnen in kleur variëren van kleurloos tot geelbruin. Dat heeft geen invloed op de werkzaamheid van het product.

WELKE MOGELIJKE BIJWERKINGEN KUNNEN OPTREDEN?

Sommige mensen hebben veel last van bijwerkingen, anderen dan weer niet. Het optreden van bijwerkingen heeft niets te maken met het effect van de behandeling. Aarzel niet je (huis)arts of (thuis)verpleegkundige te contacteren met je **vragen en eventuele onzekerheden**.

De volgende nevenwerkingen kunnen voorkomen:

- ✔ Diarree, misselijkheid en braken
- ✔ Hoofdpijn
- ✔ Aderontsteking (rode, pijnlijke, gezwollen huid op de plaats van de ader) door de intraveneuze toediening
- ✔ (Jeukende) uitslag van de huid

WAT MET ANDERE MEDICATIE?

- Meld aan je ziekenhuisarts en de ziekenhuisapotheker welke andere geneesmiddelen, vitaminen, voedingssupplementen enzovoort je gebruikt (zowel voorgeschreven door je huisarts als middelen die je op eigen initiatief neemt).

- Meld aan je huisarts welke antibioticatherapie je krijgt voor de behandeling van je infectie.

ENKELE RAADGEVINGEN

- Als je een gekende overgevoeligheid hebt voor bepaalde antibiotica, meld dit dan aan je ziekenhuisarts. Cefepim dient namelijk met voorzichtigheid gebruikt te worden bij patiënten met een gekende overgevoeligheid voor penicillineachtige antibiotica.

- (Ernstige) overgevoeligheidsreacties kunnen zich uiten als huiduitslag (eventueel over het hele lichaam), jeuk, gevoel van benauwdheid, lage bloeddruk, koorts of rillingen, en het opzwellen van lippen, tong of keel.

- Als je aanhoudende of ernstige diarree hebt, ook al is dat na het stoppen van de kuur, moet je je huisarts waarschuwen.

- Meet regelmatig je lichaamstemperatuur, bij voorkeur op het zelfde tijdstip en het best 's avonds.

WANNEER EN MET WIE MOET JE CONTACT OPNEMEN?

✔ Meld je aan op de spoedgevallendienst:
- als je rilkoorts hebt (meer dan 38 °C).

✔ Neem contact op met de huisarts:
- als je de volgende symptomen hebt: koude rillingen, hoofdpijn, keelpijn, buikkrampen, branderig gevoel bij het plassen … Neem nooit op eigen initiatief geneesmiddelen als je vermoedt dat je een infectie hebt.
- als je een reactie vertoont op het antibioticum zelf: tekens van een allergische reactie, ernstige diarree, huiduitslag, onrustigheid of bloedingen.

✔ Neem contact op met de thuisverpleegkundige:
- als je problemen hebt met de katheter: een pijnlijke ader, roodheid, zwelling, een warm gevoel en/of pijn rond de katheter.

NUTTIGE CONTACTNUMMERS

✔ OPAT-team van het ziekenhuis:

- Telefonisch: +32 16 34 32 74
  bereikbaar op weekdagen tussen 8.30 en 13 uur en tussen 14 en 17 uur (met uitzondering van feestdagen)
- Via mail: OPAT@uzleuven.be. Je vraag wordt zo snel mogelijk beantwoord, maar dit kan tot 48 uur duren. Deze mailbox wordt niet gelezen tijdens het weekend.

Je vindt deze brochure ook op
www.uzleuven.be/brochure/701931.

NOTITIES

© oktober 2026 UZ Leuven
Overname van deze tekst en illustraties is enkel mogelijk na toestemming van de dienst communicatie UZ Leuven.

Ontwerp en realisatie
Deze tekst werd opgesteld door de ziekenhuisapotheek in samenwerking met de dienst communicatie.
Gevalideerd door de OPAT-werkgroep op 10 januari 2017.

Je vindt deze brochure ook op www.uzleuven.be/brochure/701931.

Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kun je bezorgen via communicatie@uzleuven.be.

Verantwoordelijke uitgever
UZ Leuven
Herestraat 49
3000 Leuven
tel. 016 33 22 11
www.uzleuven.be

mynexuzhealth

Raadpleeg je medisch dossier via nexuzhealth.com of download de app

ONTDEK HET OP Google Play
Download in de App Store

FSC www.fsc.org
MIX
Papier | Ondersteunt verantwoord bosbeheer
FSC® C008364

701931_v102026