

Je therapie: trastuzumab (Herceptin[®]) (DIO)

WAT IS DE SAMENSTELLING VAN DEZE THERAPIE?

De therapie bestaat uit één celremmend geneesmiddel, namelijk **trastuzumab**. Deze **doelgerichte therapie** heeft invloed op bepaalde eiwitten die betrokken zijn bij de ontwikkeling en groei van kanker. Trastuzumab wordt vaak in combinatie met een andere oncologische behandeling toegediend, namelijk chemotherapie of immuuntherapie.

HOE VERLOOPT DE THERAPIE?

Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. **Eén cyclus duurt 2 weken (14 dagen)** en omvat 1 dagopname voor de toediening van trastuzumab. Dag 1 is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus. De volgende cyclus start in principe 2 weken na dag 1, als de bloeduitslagen en je algemene toestand dit toelaten.

Generieke naam	Merknaam	Dag		Wijze van toediening
		1	2-14	
Trastuzumab	Herceptin [®]	*		Infuus over 30 minuten

WAAR WORDT DE THERAPIE TOEGEDIEND?

De toediening van trastuzumab vindt plaats via het oncologisch dagziekenhuis. Een overnachting is doorgaans niet nodig.

AANDACHTSPUNTEN BIJ TRASTUZUMAB



- Een **infuusreactie** doet zich zelden voor. Als ze toch voorkomt, is dat meestal tijdens of na de eerste toediening terwijl je nog in het ziekenhuis bent. Een infuusreactie kenmerkt zich door huiduitslag al dan niet in combinatie met jeuk (eventueel over heel het lichaam), een gevoel van benauwdheid, lage bloeddruk, koorts of rillingen. Soms gaat een reactie gepaard met een gevoel van misselijkheid of met overmatig transpireren. Het is belangrijk dat je dergelijke gewaarwordingen onmiddellijk meldt aan de verpleegkundige of arts, zodat er vlug en adequaat kan worden gereageerd. Bij volgende toedieningen zijn de risico's op een mogelijke reactie kleiner.
- Trastuzumab kan mogelijk de **hartspier verzwakken**. Je arts zal regelmatig een hartfunctie-onderzoek laten uitvoeren om dit op te volgen. Mogelijke symptomen van een verzwakte hartspier zijn kortademigheid, vochttopstapeling, toename in gewicht. Na het stoppen van de behandeling zal de hartspier zich herstellen.

- Trastuzumab veroorzaakt soms een [ontsteking ter hoogte van de longblaasjes](#). Meld onmiddellijk aan je arts als je last krijgt van hoesten of toenemende kortademigheid, want in zeldzame gevallen kan deze ‘longontsteking’ ernstige vormen aannemen.



NEVENWERKINGEN OPVOLGEN, TIJDIG MELDEN EN BESPREKEN

Volg je klachten goed op, meld en bespreek ze tijdig met je zorgverleners. Je kan je [klachten opvolgen](#) aan de hand van een [papieren dagboek](#).

Ervaar je ernstige of aanhoudende klachten of je bent ongerust over bepaalde klachten, aarzel dan niet je zorgverleners in het ziekenhuis of je huisarts te contacteren.