

Je therapie: pirtobrutinib (Jaypirca®)

DEZE BIJLAGE HOORT BIJ DE GIDS BIJ JE ONCOLOGISCHE BEHANDELING MET TABLETTEN OF CAPSULES.

WAT IS DE SAMENSTELLING VAN DEZE THERAPIE?

De therapie bestaat uit één celremmend geneesmiddel, namelijk **pirtobrutinib**. Pirtobrutinib is een **doelgerichte therapie**. Het blokkeert specifieke eiwitten die betrokken zijn bij de ontwikkeling en groei van kankercellen. Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Die dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om de bijwerkingen te beperken.

HOE VERLOOPT DE THERAPIE?

- Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. Een cyclus duurt **4 weken (28 dagen)**. De volgende cyclus start in principe 4 weken na dag 1, als de bloedsuitslagen en je algemene toestand dit toelaten.
- Je komt naar het **oncologisch dagcentrum** of de **raadpleging** voor een bloedafname, een klinisch onderzoek en een (nieuwe) voorraad tabletten. Je neemt de tabletten thuis verder in.
- Pirtobrutinib wordt **dagelijks ingenomen**, gedurende 28 dagen.
- Pirtobrutinib bestaat in tabletten van 50 mg en 100 mg. Je arts of verpleegkundige vertelt je welke dosis je dagelijks moet nemen. Afhankelijk van de ernst van eventuele nevenwerkingen die je ondervindt, kan de arts beslissen om de dosis te verlagen.

Pirtobrutinib (Jaypirca®)		Week 1	Week 2	Week 3	Week 4
1x per dag mg	 of 	✓	✓	✓	✓

Inname

- Pirtobrutinib wordt **één keer per dag** ingenomen, bij voorkeur 's ochtends. Je neemt de tabletten steeds rond **hetzelfde tijdstip** in.
- Pirtobrutinib mag zowel met als zonder voeding worden ingenomen. Je neemt de medicatie best op een **consequente manier** in:
 - Ofwel steeds **op een lege maag**: dit betekent niet eten vanaf 2 uur vóór de inname en tot 1 uur na de inname van pirtobrutinib
 - Ofwel steeds **bij een maaltijd** of ten laatste 30 minuten na de maaltijd
- **Interactie met voeding of andere voedingssupplementen**: vermijd tijdens de inname van pirtobrutinib het eten en/of drinken van pompelmoes(sap), sterfruit, Sevilla-appelsienen (bittere appelsienen) of preparaten op basis van sint-janskruid.

Wat als?

Als je een dosis pirtobrutinib bent vergeten en je merkt dit op binnen de 6 uur, dan kan je de vergeten dosis inhalen. Merk je de vergeten dosis pas veel later op (meer dan 6 uur na de geplande inname), dan sla je de vergeten dosis over en neem je de volgende dosis op het geplande tijdstip. Neem geen twee dosissen op één dag. Meld een vergeten dosis bij je volgende ziekenhuisbezoek.

Algemene richtlijnen rond de inname, bewaring en manipulatie en wat je het best doet als zich bepaalde situaties voordoen, kan je vinden in de Gids bij je oncologische behandeling met capsules of tabletten.

AANDACHTSPUNTEN BIJ PIRTOBRUTINIB

- Pirtobrutinib kan mogelijk een invloed hebben op je **hartritme of je hartfunctie**. Neem contact op met je behandelende arts als je last krijgt van dikke armen of voeten, pijn op de borstkas, ritmestoornissen of bij geringe inspanning kortademig bent of meer moet hoesten.
- De inname van pirtobrutinib kan op lange termijn het risico op huidkanker in lichte mate verhogen. **Bescherm je tegen zonlicht** en probeer zoveel mogelijk direct en indirect zonlicht te vermijden.
- Pirtobrutinib veroorzaakt soms **hoofdpijn** en **gewrichtspijn**. Als je daar last van hebt, mag je tot maximaal 4x per dag 1 gram paracetamol (Dafalgan®) innemen. Meet vooraf je lichaamstemperatuur om na te gaan of je geen koorts hebt.



NEVENWERKINGEN VOORKOMEN (zie gids)

Bescherm jezelf tegen een aantal nevenwerkingen door:



Infecties voorkomen



Mondhygiëne en mondspoeling



Huidverzorging



Wondjes voorkomen



Rust en beweging



Voorgeschreven medicatie innemen



Voldoende drinken

Bij jouw behandeling zijn ook de volgende adviezen belangrijk om nevenwerkingen te voorkomen:




~~Bloeddruk meten~~



~~Hand- en voetverzorging~~



~~Nagelbescherming~~



NEVENWERKINGEN OPVOLGEN, TIJDIG MELDEN EN BESPREKEN

Volg je klachten goed op, meld en bespreek ze tijdig met je zorgverleners. Je kan je **klachten opvolgen** aan de hand van een **papieren of elektronisch dagboek**. Je leest er meer over in de gids. Ervaar je ernstige of aanhoudende klachten of je bent ongerust over bepaalde klachten, aarzel dan niet je zorgverleners in het ziekenhuis of je huisarts te contacteren. 'Alarmsignalen' en **contactgegevens** vind je in de gids.



MOGELIJKE NEVENWERKINGEN AANPAKKEN (zie gids)

Bij jouw behandeling kunnen zich de volgende nevenwerkingen of klachten voordoen:

- Buikloop of diarree
- Huidveranderingen zoals:
 - ~~Droge huid, schilfering, jeuk~~, huiduitslag
 - ~~Huiduitslag in de vorm van puistjes~~
 - Huidveranderingen aan de handpalmen en voetzolen
- Misselijkheid en ~~braken~~
- ~~Smaak- en reukveranderingen~~
- ~~Mondslijmvliesontsteking (afters)~~
- Ongewone vermoeidheid
- Gevoelens van angst, boosheid en verdriet
- Invloed op de seksualiteit en vruchtbaarheid
- Een verminderd aantal witte bloedcellen
- Een verminderd aantal rode bloedcellen
- Een verminderd aantal bloedplaatjes
- ~~Haarveranderingen~~
- ~~Verstopping~~
- ~~Verhoogde bloeddruk~~
- ~~Tintelingen en voos-gevoel~~
- ~~Spier- en gewrichtspijn~~