



Starten met infliximab

informatie voor patiënten

INLEIDING

Uw arts heeft u een behandeling met infliximab (Flixabi[®], Inflectra[®], Remicade[®], Remsima[®] of Zessly[®]) voorgeschreven. In deze brochure geven wij u graag meer informatie over dit geneesmiddel.

WAT IS INFLIXIMAB?

Infliximab zijn eiwitten of antilichamen die het teveel aan tumor-necrosefactor of TNF blokkeren. Zo verminderen ze het ontstekingsproces dat mee de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa veroorzaakt.

BEHANDELINGSSCHEMA

Infliximab wordt gegeven via een infuus in de bloedbaan (intraveneus). Dit gebeurt tijdens een dagopname in het ziekenhuis. De hoeveelheid infliximab die u krijgt, is afhankelijk van uw lichaamsgewicht. De standaard dosis bedraagt 5 mg/kg. Na een eerste toediening van infliximab volgt er een na twee weken en een na zes weken. Als u goed reageert, krijgt u daarna een infuus om de acht weken.

Uw dosis kan mogelijk afwijken van dit schema na overleg met uw arts.

- Standaard dosering

5 mg/kg op week 0, 2, 6
oplaaddosis



5 mg/kg om de 8 weken
onderhoudsdosis

MOET IK NUCHTER ZIJN VOOR EEN BEHANDELING MET INFLIXIMAB?

U moet niet nuchter zijn voor een infliximab-infuus.

HOELANG DUURT EEN INFUUS?

Bij de start van infliximab duurt de behandeling ongeveer twee à vier uur. Vanaf het vijfde infuus kan de duurtijd meestal verkort worden naar één uur.

• Duurtijd infuus

1e infuus	2e infuus	3e infuus	4e infuus	vanaf 5e infuus
2 uur	3 tot 4 uur	3 tot 4 uur	2 uur	1 uur

Breng iemand mee om u te begeleiden tijdens het tweede en het derde infuus.

NEVENWERKINGEN

Zoals bij elk medicijn kunnen er nevenwerkingen optreden. Dit kan tijdens de infuustoediening of op een later tijdstip. De meest vermelde nevenwerkingen zijn misselijkheid, maagpijn en hoofdpijn, maar onder andere ook jeuk, zwelling of roodheid van de huid, duizeligheid, een lage bloeddruk en pijn op de borst kunnen voorkomen.

Infliximab kan uw weerstand verminderen. Hierdoor hebt u meer kans op infecties zoals herpes of griep. Infecties van de bovenste luchtwegen zoals sinusitis, komen het meeste voor.

BENT U ZIEK VOOR, TIJDENS OF NA UW BEHANDELING?

Bent u ziek of hebt u koorts ($> 37.8^{\circ}\text{C}$) **voor** uw behandeling? Verwittig dan tijdig de infuuseenheid, tel. +32 16 34 45 26.

Krijgt u symptomen **tijdens** de behandeling, verwittig dan altijd de verantwoordelijke verpleegkundige.

Hebt u problemen **na** de behandeling? Neem dan contact op met de IBD-verpleegkundigen.

Tips

- ✓ Hebt u een afspraak bij uw arts of tandarts?
Zeg dan altijd dat u een behandeling krijgt met infliximab.
- ✓ Liet u een bloedafname of onderzoek doen buiten UZ Leuven? Breng dan altijd de resultaten mee naar het ziekenhuis.
- ✓ Wordt u geopereerd of moet u een specifieke ingreep ondergaan? Hebt u (verre) reisplannen? Wil u graag zwanger worden? Breng uw arts uw of verpleegkundige dan tijdig op de hoogte.
- ✓ Vraag naar de IBD-vaccinatiebrochure.
- ✓ Laat weten welke geneesmiddelen u precies inneemt. Maak hier een lijstje van en noteer ook de dosis per geneesmiddel.
- ✓ Vergeet uw voorschriften/attest niet te vragen aan uw arts.

WAT MOET ER GEBEUREN VOOR DE OPSTART VAN DE BEHANDELING MET INFLIXIMAB?

Eerst wordt een longfoto (RX-thorax) en huidtest (intradermo) uitgevoerd worden om een vroegere blootstelling aan tuberculose uit te sluiten. Daarna zal uw arts of de IBD-verpleegkundige samen met u uw vaccinaties nakijken.

ZWANGERSCHAP EN VACCINATIES

Als u infliximab hebt gekregen terwijl u zwanger was, is het belangrijk dat u dit aan de arts van uw kindje vertelt voordat uw baby een vaccin krijgt. Uw kind mag de eerste negen maanden na de geboorte geen 'levend vaccin' krijgen, zoals het Rotavaccin.

DE VERSCHILLENDE STAPPEN VAN DE BEHANDELING MET INFLIXIMAB

- **Stap 1:** het navragen van de symptomen. De verpleegkundige begeleidt u naar uw zetel en stelt u enkele algemene vragen. Ze vraagt onder meer of u op voorhand de online vragenlijst via Mynexuzhealth hebt ingevuld en doorgestuurd. Op deze manier wint u tijd.
- **Stap 2:** meten van de parameters: bloeddruk, pols, temperatuur, gewicht
- **Stap 3:** bloedafname
- **Stap 4:** prikken van het infuus en toediening: van infliximab
- **Stap 5:** verwijderen van het infuus en controle van de parameters
- **Stap 6:** het plannen van een nieuwe afspraak

INSCHRIJVEN

U moet zich altijd inschrijven in de grote ontvangsthal van het ziekenhuis. U krijgt vervolgens een polsbandje om met uw persoonlijke gegevens. Daarna kunt u de gouden pijl volgen naar E 449 op de vierde verdieping.

BELANGRIJK

- Als u niet naar uw afspraak kunt komen, verwittig dan tijdig de infuuseenheid via tel. 016 34 45 26.
Zo kunnen wij een andere patiënt verder helpen.
- Tijdens de behandeling mag u de infuuseenheid niet verlaten.
- Er is internettoegang voorzien.
- In normale omstandigheden kunt u nadien zelf naar huis rijden.
- Gelieve de Mynexuzhealth-vragenlijst ten laatste 48 uur op voorhand in te vullen.

NOG VRAGEN?

Neem dan contact op met uw IBD-verpleegkundigen via e-mail ibdnurse@uzleuven.be

Voor dringende gevallen: tel. 016 34 06 21 (van 10 tot 12 uur)

© september 2020 UZ Leuven

Overname van deze tekst en illustraties is enkel mogelijk na toestemming van de dienst communicatie UZ Leuven.

Ontwerp en realisatie

Deze tekst werd opgesteld door de IBD-kliniek in samenwerking met de dienst communicatie.

U vindt deze brochure ook op www.uzleuven.be/brochure/701293.

Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kunt u bezorgen via communicatie@uzleuven.be.

Verantwoordelijke uitgever
UZ Leuven
Herestraat 49
3000 Leuven
tel. 016 33 22 11
www.uzleuven.be

 mynexuzhealth



Raadpleeg uw medisch dossier
via www.mynexuzhealth.be
of download de app

