

# Je therapie: osimertinib (Tagrisso<sup>®</sup>) (REO)

DEZE BIJLAGE HOORT BIJ DE GIDS 'JE ONCOLOGISCHE BEHANDELING MET TABLETTEN OF CAPSULES'.

## WAT IS DE SAMENSTELLING VAN DEZE THERAPIE?

De therapie bestaat uit één celremmend geneesmiddel (doelgerichte therapie), namelijk osimertinib. Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Die dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om de bijwerkingen te beperken.

## HOE VERLOOPT DE THERAPIE?

- Je komt naar de raadpleging of het dagziekenhuis voor een bloedafname, een klinisch onderzoek en een voorraad tabletten. Je neemt de tabletten dan thuis in.
- Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. **Eén cyclus duurt 4 weken (28 dagen).** Osimertinib (Tagrisso<sup>®</sup>) wordt dagelijks ingenomen.
- Osimertinib bestaat in tabletten van 40 mg en 80 mg. Je arts of verpleegkundige vertelt je welke dosis je dagelijks moet nemen. Afhankelijk van de ernst van de nevenwerkingen die je ondervindt, is een dosisverlaging mogelijk.

Osimertinib (Tagrisso <sup>®</sup> )	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4
..... mg 1x per dag  of 	✓	✓	✓	✓

## Inname

- Osimertinib wordt één keer per dag ingenomen, bij voorkeur 's morgens.
- Osimertinib wordt systematisch op een lege maag of bij de maaltijd ingenomen.
- **Interactie met voeding:** vermijd tijdens de inname van osimertinib het eten of drinken van pompoes(sap), granaatappel, sterfruit of preparaten op basis van sint-janskruid.

## Wat als?

Als je een dosis osimertinib bent vergeten, kan je de vergeten dosis inhalen tot 12 uur vóór de volgende dosis. Wanneer er minder dan 12 uur is vóór de volgende dosis, dan sla je de vergeten dosis over en neem je volgende dosis op het geplande tijdstip.

**Algemene richtlijnen rond de inname, bewaring en manipulatie en wat je het best doet als zich bepaalde situaties voordoen, kan je vinden in de gids 'je oncologische behandeling met tabletten of capsules'.**

## AANDACHTSPUNTEN BIJ OSIMERTINIB

- Osimertinib kan mogelijk een ontsteking van de longblaasjes (pneumonitis) veroorzaken. Verwittig je behandelende arts als je meer last krijgt van hoesten of sneller kortademig bent.



### NEVENWERKINGEN VOORKOMEN (zie brochure)

Bescherm jezelf tegen een aantal nevenwerkingen door:



Infecties voorkomen



Mondhygiëne en  
mondspoeling



Huidverzorging



Wondjes voorkomen



Rust en beweging



Voorgeschreven  
medicatie innemen



Voldoende drinken

Bij jouw behandeling zijn ook de volgende adviezen belangrijk om nevenwerkingen te voorkomen:



~~Bloeddruk meten~~



~~Hand- en  
voetverzorging~~



~~Nagelbescherming~~



### MOGELIJKE NEVENWERKINGEN AANPAKKEN (zie brochure)

Bij jouw behandeling kunnen zich de volgende nevenwerkingen of klachten voordoen:

- Buikloop of diarree
- Huidveranderingen zoals:
  - Droge huid, schilfering, jeuk, huiduitslag
  - Huiduitslag in de vorm van puistjes
  - ~~Huidveranderingen aan de handpalmen en voetzolen~~
- Misselijkheid en braken
- ~~Smaak- en reukveranderingen~~
- Mondslijmvliesontsteking (aften)
- Een verminderd aantal witte bloedcellen
- ~~Een verminderd aantal rode bloedcellen~~
- Een verminderd aantal bloedplaatjes
- ~~Haarveranderingen~~
- Nagelveranderingen
- ~~Verstopping~~
- ~~Verhoogde bloeddruk~~
- ~~Tintelingen en voos-gevoel~~
- ~~Spier- en gewrichtspijn~~
- Ongewone vermoeidheid
- Gevoelens van angst, boosheid en verdriet
- Invloed op de seksualiteit