

Je therapie: avelumab (Bavencio[®]) - axitinib (Inlyta[®]) (AMO)

DEZE BIJLAGE HOORT BIJ DE GIDS 'JE ONCOLOGISCHE BEHANDELING MET TABLETTEN OF CAPSULES'.



WAT IS DE SAMENSTELLING VAN DEZE THERAPIE?

De therapie bestaat uit één celremmend geneesmiddel (doelgerichte therapie), namelijk axitinib en één immunotherapie: avelumab. Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Die dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om de bijwerkingen te beperken.

HOE VERLOOPT DE THERAPIE?

Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. **Eén cyclus avelumab (Bavencio[®]) duurt 2 weken (14 dagen) en omvat 1 opname voor immunotherapie. Axitinib (Inlyta[®]) wordt dagelijks ingenomen.**

Axitinib bestaat in tabletten van 1 mg en 5 mg. Je arts of verpleegkundige vertelt je welke dosis je dagelijks moet innemen. Afhankelijk van de ernst van de nevenwerkingen die je ondervindt, is een dosisverlaging mogelijk.

		Week 1	Week 2
Axitinib (Inlyta[®]) 2 x per dag mg 's morgens	 of 	✓	✓
	 mg 's avonds	✓
Avelumab (Bavencio[®]) Infuus over 1 uur		1 x op dag 1	Geen toediening
Ondersteunende medicatie Zyrtec [®] 10 mg Dafalgan [®] 1 gram		30 minuten voor de toediening van avelumab	

WAAR WORDT DE THERAPIE TOEGEDIEND?

Je komt naar het dagziekenhuis voor een bloedafname, een klinisch onderzoek, de toediening van avelumab en een nieuwe voorraad tabletten. Je neemt de tabletten dan thuis verder in.

INNAME AXITINIB

- Axitinib wordt **tweemaal per dag** ingenomen met **12 uur tussen** beide innames.
- Axitinib wordt systematisch **bij de maaltijd of op een lege maag ingenomen**.
- **Interactie met voeding:** vermijd tijdens de inname van axitinib het eten of drinken van pomelmoes(sap) of preparaten op basis van sint-janskruid.
- **Interactie met medicatie:** Pijnmedicatie op basis van aspirine en ontstekingswerende medicatie zoals ibuprofen kan je tijdens de behandeling met axitinib beter vermijden omdat ze het risico op een bloeding verhogen. Paracetamol kan je veilig gebruiken als pijnmedicatie. Maagzuurremmers zoals Maalox[®] antacid, Rennie[®], Gaviscon[®], omeprazol, pantoprazol ... kunnen een invloed hebben op de werking van axitinib. Bespreek het met je behandelende arts als je die medicijnen regelmatig gebruikt.

WAT ALS?

Als je een dosis axitinib bent vergeten, **sla dan de vergeten dosis over**. Neem de volgende dosis op het geplande tijdstip.

Algemene richtlijnen rond de inname, bewaring en manipulatie en wat je het best doet als zich bepaalde situaties voordoen, kan je vinden in de gids 'je oncologische behandeling met tabletten of capsules'.

AANDACHTSPUNTEN BIJ AXITINIB - AVELUMAB

- Axitinib kan de genezing van een wonde vertragen. Overleg met je behandelende arts als je een ingreep nodig hebt. Mogelijk moet je stoppen met axitinib 5 dagen vóór de ingreep tot 5 dagen na de ingreep.
- In zeldzame gevallen heeft axitinib een invloed op de bloedsuikerspiegel.
- Er kan zich een **infuusreactie** voordoen op avelumab. Om dat te voorkomen krijg je de eerste 4 cycli ondersteunende medicatie, namelijk Zyrtec® 10 mg en Dafalgan® 1 gr. Nadien beslist je arts of het nodig is om de ondersteunende medicatie verder te nemen. Een infuusreactie kenmerkt zich door huiduitslag (eventueel over heel het lichaam), een gevoel van benauwdheid, lage bloeddruk, koorts of rillingen. Soms gaat een reactie gepaard met een gevoel van misselijkheid of met overmatig transpireren. Het is belangrijk dat je dergelijke gewaarwordingen onmiddellijk meldt aan de verpleegkundige of arts, zodat er vlug en adequaat kan worden gereageerd.
- **Diarree en vermoeidheid** kunnen beide een mogelijke nevenwerking zijn van axitinib maar ook van avelumab. De aanpak van die nevenwerkingen verschilt naargelang de oorzaak. Het is aangewezen contact op te nemen met je behandelende arts om na te gaan wat de juiste oorzaak is. Gaat het om een nevenwerking ten gevolge van axitinib, dan kan je veilig aan de slag met de tips die je vindt in de brochure. Is het een nevenwerking ten gevolge van immunotherapie (avelumab), dan zal je behandelende arts een andere aanpak voorstellen.



- Het gebeurt soms dat immunotherapie niet alleen de kankercellen aanvalt, maar ook het eigen lichaam. Bepaalde organen (bijvoorbeeld de lever, de darmen, longen, huid en klieren) kunnen daardoor ontstoken raken. We spreken dan van een **auto-immuunreactie**. Deze reactie kan zich uiten onder de vorm van klachten die onschuldig lijken, zoals jeuk, buikpijn en diarree.



- Het is erg belangrijk dat een auto-immuunreactie tijdig wordt vastgesteld en behandeld. **Neem daarom onmiddellijk contact op met je behandelende arts als je de volgende klachten ervaart:**



Kortademigheid
Hoesten



Hoofdpijn
Buikpijn
Pijn ter hoogte van de lever (= rechts van de maagstreek)
Pijnlijke of gezwollen gewrichten



Extreme dorst



Huiduitslag
Jeuk
Geel worden van de huid



Veranderde stemming
Gedepimeerd
Sneller geïrriteerd
Opvliegend zijn



Geel worden van het oogwit
Slecht zien



Vermoeidheid
Lusteloosheid
(Spier)zwakte
Sufheid



Minder of net meer plassen
Donkere urine
Diarree of buikloop
Bloed in de ontlasting



Gewichtsverandering (zonder dat je eetpatroon is veranderd)
Gewichtsverlies ondanks méér eetlust



NEVENWERKINGEN VOORKOMEN (zie brochure)

Bescherm jezelf tegen een aantal nevenwerkingen door:



Infecties voorkomen



Mondhygiëne en
mondspoeling



Huidverzorging



Wondjes voorkomen



Rust en beweging



Voorgeschreven
medicatie innemen



Voldoende drinken

Bij jouw behandeling zijn ook de volgende adviezen belangrijk om nevenwerkingen te voorkomen:



Bloeddruk meten



Hand- en
voetverzorging



~~Nagelbescherming~~



MOGELIJKE NEVENWERKINGEN AANPAKKEN (zie brochure)

Bij jouw behandeling kunnen zich de volgende nevenwerkingen of klachten voordoen:

- Buikloop of diarree
- Huidveranderingen zoals:
 - Droge huid, schilfering, jeuk, huiduitslag
 - ~~Huiduitslag in de vorm van puistjes~~
 - Huidveranderingen aan de handpalmen en voetzolen
- Misselijkheid en braken
- Smaak- en reukveranderingen
- Mondslimvliesontsteking (afters)
- Ongewone vermoeidheid
- Gevoelens van angst, boosheid en verdriet
- Invloed op de seksualiteit
- Een verminderd aantal witte bloedcellen
- Een verminderd aantal rode bloedcellen
- Een verminderd aantal bloedplaatjes
- ~~Haarveranderingen~~
- ~~Nagelveranderingen~~
- ~~Verstopping~~
- Verhoogde bloeddruk
- ~~Tintelingen en voos-gevoel~~
- Spier- en gewrichtspijn