

## Richtlijnen anticoagulantia bij THERAPEUTISCHE endoscopische procedure

Anticoagulantia	Richtlijn
Asaflow (primaire preventie)	5 dagen vooraf stoppen
Asaflow (secundaire preventie)	Niet stoppen
Aggrenox	Ochtend van ingreep niet innemen
Plavix	5 dagen vooraf stoppen
Efient	7 dagen vooraf stoppen
Brilique	5 dagen vooraf stoppen
Ticlid	5 dagen vooraf stoppen
Marcoumar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 dagen vooraf stoppen</li> <li>• Start profylactische of intermediaire dosis LMWH zodra INR &lt;2</li> <li>• Geen Clexane ochtend van het onderzoek</li> </ul>
Xarelto	1 à 2 dagen vooraf stoppen
Eliquis	1 à 2 dagen vooraf stoppen
Pradaxa	1 dag vooraf stoppen bij normale nierfunctie 2 dagen vooraf stoppen bij: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CrCl &lt; 50 ml/min bij Dabigatran)</li> <li>• CrCl &lt; 30 ml/min bij Rivaroxaban/apixaban</li> </ul>

1 dag = minimum 24 uur tussen laatste inname en endoscopisch therapeutische procedure