

Je therapie: encorafenib (Braftovi[®])

(DIO)

DEZE BIJLAGE HOORT BIJ DE GIDS 'JE ONCOLOGISCHE BEHANDELING MET TABLETTEN OF CAPSULES'.

WAT IS DE SAMENSTELLING VAN DEZE THERAPIE?

De therapie bestaat uit een celremmend geneesmiddel (doelgerichte therapie), namelijk encorafenib. Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Die dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om de bijwerkingen te beperken.

HOE VERLOOPT DE THERAPIE?

- Encorafenib wordt gecombineerd met een andere celremmende therapie, namelijk cetuximab (Erbix[®]). Informatie over cetuximab vind je op een aparte bijlage.
- Je komt naar het dagziekenhuis voor een bloedafname, een klinisch onderzoek, een voorraad capsules en de toediening van cetuximab. Je neemt de capsules encorafenib dan thuis in.
- Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. **Eén cyclus duurt 4 weken (28 dagen). Encorafenib (Braftovi[®]) wordt dagelijks ingenomen.**
- Encorafenib bestaat in capsules van 50 mg en 75 mg. Je arts of verpleegkundige vertelt je welke dosis je dagelijks moet nemen. Afhankelijk van de ernst van de nevenwerkingen die je ondervindt, is een dosisverlaging mogelijk.

Encorafenib (Braftovi [®]) 1x/dag	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4
's morgens mg encorafenib  of 	✓	✓	✓	✓

Inname

- Encorafenib wordt **één keer per dag** ingenomen **bij voorkeur 's morgens**.
- Encorafenib wordt systematisch **op een lege maag of bij de maaltijd** ingenomen.
- **Interactie met voeding:** vermijd tijdens de inname van encorafenib het eten of drinken van pompoemes(sap) of preparaten op basis van sint-janskruid.

Wat als?

Als je een dosis **encorafenib** bent vergeten, kan je **de vergeten dosis inhalen tot 12 uur vóór de volgende dosis**. Wanneer er minder dan 12 uur is vóór de volgende dosis, sla je de vergeten dosis over en neem je volgende dosis op het geplande tijdstip.

Algemene richtlijnen rond de inname, bewaring en manipulatie en wat je het best doet als zich bepaalde situaties voordoen, kan je vinden in de gids 'je oncologische behandeling met tabletten of capsules'.

AANDACHTSPUNTEN BIJ ENCORAFENIB

- Door de inname van encorafenib kan het gebeuren dat je last hebt van koorts, hoofd-, spier- en gewrichtspijn. Daarvoor mag je 1 gram paracetamol innemen, maximaal 4 keer per dag. Controleer daarom regelmatig je lichaamstemperatuur.
- Soms krijg je door de inname van deze medicijnen last van wazig zicht, droge of rode ogen of een ontsteking aan de ogen. Neem contact op met je behandelende arts als je dat ervaart.
- De medicijnen kunnen mogelijk een invloed hebben op de werking van je hart. Neem contact op met je behandelende arts als je pijn op de borstkas, hartkloppingen of kortademigheid ervaart.
- Door de inname van encorafenib is je huid heel gevoelig voor zonlicht, kan je snel verbranden en kan de huiduitslag door het zonlicht verergeren. Bescherm je daarom tegen zonlicht en probeer zoveel mogelijk direct en indirect zonlicht te vermijden.



NEVENWERKINGEN VOORKOMEN (zie brochure)

Bescherm jezelf tegen een aantal nevenwerkingen door:



Infecties voorkomen



Mondhygiëne en mondspoeling



Huidverzorging



Wondjes voorkomen



Rust en beweging



Voorgescreven medicatie innemen



Voldoende drinken

Bij jouw behandeling zijn ook de volgende adviezen belangrijk om nevenwerkingen te voorkomen:



Bloeddruk meten



Hand- en voetverzorging



Nagelbescherming



MOGELIJKE NEVENWERKINGEN AANPAKKEN (zie brochure)

Bij jouw behandeling kunnen zich de volgende nevenwerkingen of klachten voordoen:

- Buikloop of diarree
- Huidveranderingen zoals:
 - Droge huid, schilfering, jeuk, huiduitslag
 - Huiduitslag in de vorm van puistjes
 - Huidveranderingen aan de handpalmen en voetzolen
- Misselijkheid en braken
- Smaak- en reukveranderingen
- ~~Mondslijmvliesontsteking (afters)~~
- Ongewone vermoeidheid
- Gevoelens van angst, boosheid en verdriet
- Invloed op de seksualiteit
- ~~Een verminderd aantal witte bloedcellen~~
- ~~Een verminderd aantal rode bloedcellen~~
- ~~Een verminderd aantal bloedplaatjes~~
- ~~Haarveranderingen~~
- ~~Nagelveranderingen~~
- ~~Verstopping~~
- ~~Verhoogde bloeddruk~~
- Tintelingen en voos gevoel
- Spier- en gewrichtspijn