

INFORMATIEFORMULIER VOOR DE PATIËNT MET OPAT (OUTPATIENT PARENTERAL ANTIMICROBIAL THERAPY)

Thuisbehandeling met intraveneuze antibioticatherapie

**Geachte heer,
Geachte mevrouw,**

Indien u langdurig wordt behandeld met intraveneuze antibiotica ('via de ader'), biedt UZ Leuven u de mogelijkheid om deze therapie thuis verder te zetten. Dit betekent dat een thuisverpleegkundige uw behandeling met antibiotica gedurende meerdere dagen bij u thuis toedient via een intraveneuze katheter. De zorg wordt gecoördineerd en begeleid door een team van artsen, ziekenhuisapothekers en verpleegkundigen van het zorgteam van UZ Leuven, samen met uw thuisverpleegkundige.

Door middel van dit formulier wensen we u wat meer informatie te geven over het algemene verloop van een thuisbehandeling met intraveneuze antibioticatherapie (zie ook Figuur 1 op pagina 4). Verder proberen we u ook reeds een antwoord te geven op een aantal veel gestelde vragen (bijv. de kostprijs van deze behandeling en de voorziening van het materiaal voor thuisbehandeling).

1. Wat is de doelstelling?

Het aanbieden van deze thuisbehandeling heeft het voordeel dat u verder kan behandeld worden in uw eigen thuisomgeving en sociale context (beroepsactiviteit, familiale situatie). Op deze manier streven we ernaar u een betere kwaliteit van zorg te kunnen bieden.

2. Wie komt in aanmerking voor een thuisbehandeling?

Uw behandelende arts in het ziekenhuis beslist of u in aanmerking komt voor een behandeling met intraveneuze antibioticatherapie thuis. Gespecialiseerde zorgverleners gaan vervolgens na of aan alle nodige voorwaarden wordt voldaan. Deze beslissing wordt genomen op basis van de ernst van de infectie en op basis van fysieke, cognitieve en sociale factoren.

De uiteindelijke keuze voor ontslag ligt bij u als patiënt. Indien u uw akkoord geeft voor een thuisbehandeling met intraveneuze antibioticatherapie, zullen uw zorgverleners in het ziekenhuis starten met de verdere ontslagregeling.

3. Hoeveel kost mij deze thuisbehandeling met intraveneuze antibiotica?

Als patiënt betaalt u een persoonlijk aandeel in de kosten van een thuisbehandeling (dit wordt het remgeld genoemd). Uw zorgverleners zullen u vooraf verder informeren over het bedrag van dit persoonlijk aandeel. Door uw akkoord te geven voor een thuisbehandeling met intraveneuze antibiotica geeft u ook aan dat u voldoende geïnformeerd werd over deze kosten.

Indien u een hospitalisatieverzekering hebt, raden wij u aan om uw verzekeringskantoor te contacteren. Mogelijk komt uw hospitalisatieverzekering (voor een gedeelte) tegemoet in de kosten. Indien u wenst, kan de dienst sociaal werk van het UZ Leuven u hierin bijstaan voor verder advies.

4. Wat dient er te gebeuren vooraleer u naar huis kan?

- Er wordt een geschikte intraveneuze katheter geplaatst in het ziekenhuis die als toegangsweg dient voor de toediening van het antibioticum. Het kan ook zijn dat u reeds een poortkatheter of een getunnelde veneuze katheter hebt die gebruikt kan worden voor de behandeling met intraveneuze antibiotica.
- Minstens de eerste dosis van de antibioticatherapie zal toegediend worden in het ziekenhuis.
- U zal (eventueel samen met uw familie) mondelinge en schriftelijke informatie ontvangen van een gespecialiseerde zorgverlener over de antibioticatherapie, de intraveneuze katheter, mogelijke problemen die u kan tegenkomen wanneer u thuis bent en wat u in dat geval moet doen. U ontvangt ook de contactgegevens van uw zorgverleners in het ziekenhuis en thuis.
- Alle antibiotica en materiaal worden voorzien vanuit de ziekenhuisapotheek van UZ Leuven. Bij uw ontslag zal u dit materiaal meekrijgen vanuit de verpleegeenheid waarop u bent opgenomen.

Opmerking: in het geval van een langdurige thuisbehandeling met antibioticatherapie kan het zijn dat niet al het materiaal voor de volledige duur van de behandeling in één keer kan meegegeven worden. Daarom bestaat de mogelijkheid dat u gedurende het verloop van de thuisbehandeling één of meerdere extra pakket(ten) met materiaal in de ziekenhuisapotheek zal moeten komen halen (2^{de} verdiep, bruine pijl). Dit zal duidelijk naar u gecommuniceerd worden door uw behandelende zorgverleners in het ziekenhuis.

- Uw zorgverleners in het ziekenhuis contacteren de thuisverpleegkundigen en organiseren de opstart van de thuiszorg. In samenspraak met u en de thuisverpleegkundige zal het zorgteam van UZ Leuven vervolgens bekijken wanneer u uit het ziekenhuis ontslagen kan worden.

5. Hoe verloopt de zorg eens u thuis bent?

- Afhankelijk van het uur van uw ontslag en het antibioticum waarmee u behandeld wordt zal het eerste thuiscontact met de thuisverpleegkundige op de dag van uw ontslag uit het ziekenhuis of de dag na uw ontslag plaatsvinden. Vervolgens zal de thuisverpleegkundige gedurende de resterende duur van de antibioticatherapie één- of meermaals daags bij u thuis langskomen om het antibioticum toe te dienen, de intraveneuze katheter te verzorgen en de infectie verder op te volgen.
- Tijdens de gehele duur van uw behandeling zullen de zorgverleners in UZ Leuven en uw thuisverpleegkundige regelmatig met elkaar communiceren over uw behandeling via telefoon, e-mail en het elektronisch patiëntendossier. De thuisverpleegkundige zal wekelijks een verslag van uw behandeling aan het ziekenhuis bezorgen via e-mail.
- Uw behandelende arts in het ziekenhuis blijft, ook tijdens de thuisbehandeling, verantwoordelijk voor de behandeling. Dat betekent dat uw huisarts (of huisarts van wacht) uw antibioticatherapie slechts zal aanpassen na overleg met uw behandelende arts in het ziekenhuis.
- Opvolging tijdens en/of op het einde van uw behandeling wordt ingepland in UZ Leuven.
- Indien er zich problemen zouden stellen wanneer u thuis bent, kan u steeds uw thuisverpleegkundige, huisarts of zorgverleners in het ziekenhuis bereiken. In de informatiebrochures vindt u meer informatie over welke zorgverlener u best bij welk probleem contacteert.

6. Wat verwachten wij van u?

Als patiënt hebt u tijdens een thuisbehandeling ook een actieve rol.

- U volgt de geplande zorgen en de antibioticabehandeling (tijdstip van zorg en toediening) mee op.
- Indien u nevenwerkingen of andere problemen ervaart (zie informatiebrochures bijv. temperatuursverhoging > 38°C, klachten ter hoogte van de katheter) contacteert u onmiddellijk de thuisverpleegkundige, de huisarts of het ziekenhuis.
- Indien u uw behandeling niet kan krijgen op het geplande tijdstip, neemt u contact op met uw thuisverpleegkundige zodat zij indien nodig gepaste acties kunnen ondernemen.
- U bent tijdig aanwezig op geplande onderzoeken en consultaties. Indien u deze afspraken niet kan bijwonen, vragen wij u om de zorgverleners in het ziekenhuis op de hoogte te brengen.

7. Wat gebeurt er op het einde van de therapie?

Op het einde van de therapie heeft u een opvolgconsultatie bij uw behandelende arts in het ziekenhuis.

Indien u nog resterend materiaal heeft, kan u dit terugbezorgen aan de ziekenhuisapotheek (2^{de} verdiep, bruine pijl). In functie van de bewaring thuis en de conditie van het materiaal wordt bekeken of er voor u een herberekening van de kosten m.b.t. het materiaal kan gebeuren met aanpassing van uw factuur.

Indien er geen verdere nood is aan een intraveneuze katheter zal deze worden verwijderd. Afhankelijk van het soort katheter en de keuze van uw behandelende zorgverleners kan dit ofwel in het ziekenhuis, ofwel bij u thuis door de thuisverpleegkundige gebeuren.

8. Wat als u de therapie thuis wenst te beëindigen?

Als patiënt bent u steeds vrij te beslissen om terug te keren naar het ziekenhuis, ongeacht uw motivering. Indien de kwaliteit van zorg thuis in het gedrang komt om eender welke reden, kan de behandeling opnieuw hernomen worden in het ziekenhuis. Deze beslissing wordt genomen in overleg met u, uw behandelende arts en het zorgteam van UZ Leuven.

9. Wat gebeurt er met uw gegevens?

Tijdens uw behandeling zullen bepaalde gegevens over u verzameld worden in het elektronisch patiëntendossier.

In het kader van de kwaliteitsopvolging en met het oog op het doorvoeren van toekomstige verbeteringen aan dit project, bestaat de mogelijkheid dat uw gegevens gebruikt zullen worden voor onderzoek. Alle personen die voor onderzoek uw gegevens inkijken, zijn gebonden door het beroepsgeheim of de vertrouwelijkheidsverplichting. Uw directe identificatiegegevens, zoals uw naam en geboortedatum, zullen niet worden bekendgemaakt. Uw identiteit blijft ook vertrouwelijk in het geval er bepaalde resultaten zouden gepubliceerd worden.

In het kader van uw therapieopvolging zullen uw zorgverleners in UZ Leuven, uw huisarts en uw thuisverpleegkundige eveneens geregeld communiceren over uw therapie thuis. Hierbij zullen er bepaalde gegevens over u onderling gedeeld worden.

Door uw akkoord te geven voor de verderzetting van de intraveneuze antibioticatherapie bij uw thuis geeft u aan dat u voldoende geïnformeerd bent met betrekking tot deze behandeling, bovenstaande informatie hebt gelezen en dat u akkoord bent met de vermeldingen in dit formulier.

Indien u nog verdere vragen heeft met betrekking tot de thuistherapie, aarzel dan niet om contact op te nemen met een van de gespecialiseerde OPAT zorgverleners.

Met dank voor uw medewerking.
Het OPAT team

Telefoon: 016 34 32 74

E-mail: opat@uzleuven.be

Algemeen overzicht m.b.t. het algemene verloop van een thuisbehandeling met intraveneuze antibioticatherapie

Beslissing tot thuisbehandeling met intraveneuze antibioticatherapie



Ontslagvoorbereiding (door OPAT zorgteam):

- ✓ Plaatsen van geschikte katheter
- ✓ Ontvangen van mondelinge en schriftelijke informatie
- ✓ Ontvangen van nodige antibiotica en materiaal voor thuistoediening
- ✓ Contacteren thuisverpleegkundige en regelen thuiszorg



Ontslag uit het ziekenhuis



Thuisbehandeling door thuisverpleegkundige:

- ✓ Toedienen antibioticum, opvolgen katheterzorg en opvolgen infectie
- ✓ Regelmatig contact tussen thuisverpleegkundige en zorgverleners UZ Leuven



Indien van toepassing:

- ✓ Tussentijdse opvolgconsultaties in het ziekenhuis
- ✓ Afhalen extra pakket met antibiotica en materiaal in de ziekenhuisapotheek van het UZ Leuven



Einde behandeling:

- ✓ Afsluitende opvolgconsultatie in ziekenhuis
- ✓ Indien van toepassing: verwijderen katheter