

Je therapie: lorlatinib (Lorviqua[®]) (REO)



DEZE BIJLAGE HOORT BIJ DE GIDS 'JE ONCOLOGISCHE BEHANDELING MET TABLETTEN OF CAPSULES'.

WAT IS DE SAMENSTELLING VAN DEZE THERAPIE?

De therapie bestaat uit één celremmend geneesmiddel (doelgerichte therapie), namelijk lorlatinib. Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Die dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om de bijwerkingen te beperken.

HOE VERLOOPT DE THERAPIE?

- Je komt naar de raadpleging of het dagziekenhuis voor een bloedafname, een klinisch onderzoek en een voorraad tabletten. Je neemt de tabletten dan thuis in.
- Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. **Eén cyclus duurt 4 weken (28 dagen).** Lorlatinib (Lorviqua[®]) wordt dagelijks ingenomen.
- Lorlatinib bestaat in tabletten van 25 mg en 100 mg. Je arts of verpleegkundige vertelt je welke dosis je dagelijks moet nemen. Afhankelijk van de ernst van de nevenwerkingen die je ondervindt, is een dosisverlaging mogelijk.

Lorlatinib (Lorviqua [®])	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4
..... mg 1x per dag  of 	✓	✓	✓	✓

Inname

- Lorlatinib wordt één keer per dag ingenomen.
- Lorlatinib wordt systematisch op een lege maag of bij de maaltijd ingenomen.
- **Interactie met voeding:** vermijd tijdens de inname van lorlatinib het eten of drinken van pomelmoes(sap) of preparaten op basis van sint-janskruid.

Wat als?

Als je een dosis lorlatinib bent vergeten, kan je de vergeten dosis inhalen tot minstens 4 uur vóór de volgende dosis. Wanneer er minder dan 4 uur is vóór de volgende dosis, dan sla je de vergeten dosis over en neem je volgende dosis op het geplande tijdstip.

Algemene richtlijnen rond de inname, bewaring en manipulatie en wat je het best doet als zich bepaalde situaties voordoen, kan je vinden in de gids 'je oncologische behandeling met tabletten of capsules'.

AANDACHTSPUNTEN BIJ LORLATINIB

- Omwille van het effect van lorlatinib op het centrale zenuwstelsel kunnen mogelijk geheugen- en concentratieproblemen, vermoeidheid en stemmingswisselingen ontstaan. Daardoor is voorzichtigheid geboden bij het rijden met de wagen.
- Lorlatinib kan een invloed hebben op het cholesterolgehalte in het bloed.
- Door de inname van lorlatinib kan je vocht opstapelen. Daardoor kan je gewicht toenemen.
- Door de inname van lorlatinib kan het gebeuren dat je meer moet hoesten of kortademig wordt. Neem contact op met je behandelende arts als je dit symptoom ervaart.
- Lorlatinib kan mogelijk een invloed hebben op je hartritme. Neem contact op met je behandelende arts als je pijn op de borstkas, hartkloppingen of kortademigheid ervaart.



NEVENWERKINGEN VOORKOMEN (zie brochure)

Bescherm jezelf tegen een aantal nevenwerkingen door:



Infecties voorkomen



Mondhygiëne en mondspoeling



Huidverzorging



Wondjes voorkomen



Rust en beweging



Voorgeschreven medicatie innemen



Voldoende drinken

Bij jouw behandeling zijn ook de volgende adviezen belangrijk om nevenwerkingen te voorkomen:



Bloeddruk meten



Hand- en voetverzorging



Nagelbescherming



MOGELIJKE NEVENWERKINGEN AANPAKKEN (zie brochure)

Bij jouw behandeling kunnen zich de volgende nevenwerkingen of klachten voordoen:

- Buikloop of diarree
- ~~Huidveranderingen zoals:~~
 - ~~Droge huid, schilfering, jeuk, huiduitslag~~
 - ~~Huiduitslag in de vorm van puistjes~~
 - ~~Huidveranderingen aan de handpalmen en voetzolen~~
- ~~Misselijkheid en braken~~
- ~~Smaak- en reukveranderingen~~
- ~~Mondslimvliesontsteking (afters)~~
- Ongewone vermoeidheid
- Gevoelens van angst, boosheid en verdriet
- Invloed op de seksualiteit
- ~~Een verminderd aantal witte bloedcellen~~
- ~~Een verminderd aantal rode bloedcellen~~
- ~~Een verminderd aantal bloedplaatjes~~
- ~~Haarveranderingen~~
- ~~Nagelveranderingen~~
- ~~Verstopping~~
- ~~Verhoogde bloeddruk~~
- ~~Tintelingen en voos gevoel~~
- ~~Spier- en gewrichtspijn~~