


ASPRE -T



Studie naar het nut van lage dosis aspirine in de preventie van pre-eclampsie bij tweelingzwangerschappen


Graag nodigen wij alle vrouwen die een tweeling verwachten uit voor deelname aan de ASPRE-T studie. Deze internationale studie bij 2400 tweelingen onderzoekt of lage dosis aspirine opgestart vanaf het ogenblik van de 12 weken echografie de kans op pre-eclampsie verkleint.

Tweelingen hebben een 10-maal groter risico om pre-eclampsie voor 37 weken te ontwikkelen wat kan leiden tot vroeggeboorte van de baby's en verwikkelingen bij de moeder. Lage dosis aspirine is veilig en verkleint de kans op vroege pre-eclampsie bij een hoog-risico eenlingzwangerschap. We weten momenteel niet of dit ook geldt voor tweelingen omdat de oorzaak van pre-eclampsie mogelijks verschilt tussen een een- en tweelingzwangerschap.

Als U wenst deel te nemen aan de studie dan heeft U een gelijke kans om ofwel lage dosis aspirine ofwel een placebo-tablet in te nemen tot de 36ste zwangerschapsweek. De zwangerschapsopvolging zelf blijft ongewijzigd. De studie vergelijkt dan het voorkomen van vroege pre-eclampsie na toediening van aspirine en placebo.

Voor meer informatie kan u ons steeds contacteren:
Prof. Dr. Liesbeth Lewi Liesbeth.Lewi@uzleuven.be
Mw. Joke De Roover Joke.Deroover@uzleuven.be

ASPRE -T



Studie naar het nut van lage dosis aspirine in de preventie van pre-eclampsie bij tweelingzwangerschappen


Graag nodigen wij alle vrouwen die een tweeling verwachten uit voor deelname aan de ASPRE-T studie. Deze internationale studie bij 2400 tweelingen onderzoekt of lage dosis aspirine opgestart vanaf het ogenblik van de 12 weken echografie de kans op pre-eclampsie verkleint.

Tweelingen hebben een 10-maal grotere kans om pre-eclampsie voor 37 weken te ontwikkelen wat kan leiden tot vroeggeboorte van de baby's en verwikkelingen bij de moeder. Lage dosis aspirine is veilig en verkleint de kans op vroege pre-eclampsie bij een hoog-risico eenlingzwangerschap. We weten momenteel niet of dit ook geldt voor tweelingen omdat de oorzaak van pre-eclampsie mogelijks verschilt tussen een een- en tweelingzwangerschap.

Als U wenst deel te nemen aan de studie dan heeft U een gelijke kans om ofwel lage dosis aspirine ofwel een placebo-tablet in te nemen tot de 36ste zwangerschapsweek. De zwangerschapsopvolging zelf blijft ongewijzigd. De studie vergelijkt dan het voorkomen van vroege pre-eclampsie na toediening van aspirine en placebo.

Voor meer informatie kan u ons steeds contacteren:
Prof. Dr. Liesbeth Lewi Liesbeth.Lewi@uzleuven.be
Mw. Joke De Roover Joke.Deroover@uzleuven.be

ASPRE -T



Studie naar het nut van lage dosis aspirine in de preventie van pre-eclampsie bij tweelingzwangerschappen

Graag nodigen wij alle vrouwen die een tweeling verwachten uit voor deelname aan de ASPRE-T studie. Deze internationale studie bij 2400 tweelingen onderzoekt of lage dosis aspirine opgestart vanaf het ogenblik van de 12 weken echografie de kans op pre-eclampsie verkleint.

Tweelingen hebben een 10-maal groter risico om pre-eclampsie voor 37 weken te ontwikkelen wat kan leiden tot vroeggeboorte van de baby's en verwikkelingen bij de moeder. Lage dosis aspirine is veilig en verkleint de kans op vroege pre-eclampsie bij een hoog-risico eenlingzwangerschap. We weten momenteel niet of dit ook geldt voor tweelingen omdat de oorzaak van pre-eclampsie mogelijks verschilt tussen een een- en tweelingzwangerschap.

Als U wenst deel te nemen aan de studie dan heeft U een gelijke kans om ofwel lage dosis aspirine ofwel een placebo-tablet in te nemen tot de 36ste zwangerschapsweek. De zwangerschapsopvolging zelf blijft ongewijzigd. De studie vergelijkt dan het voorkomen van vroege pre-eclampsie na toediening van aspirine en placebo.

Voor meer informatie kan u ons steeds contacteren:
Prof. Dr. Liesbeth Lewi Liesbeth.Lewi@uzleuven.be
Mw. Joke De Roover Joke.Deroover@uzleuven.be

