

CONTACTGEGEVENS

Diensthooofd:

prof. Christel Van Geet



Hoofdverpleegkundigen:

Eenheid 341	Lucie Vandueren en Erika Geens, tel. 016 34 34 10
Eenheid 343	Jeanne Vets, tel. 016 34 34 30
Eenheid 331	Anne-Marie Bangels, tel. 016 34 33 10
Eenheid 305	Anna Demol, tel. 016 34 31 40
Eenheid 210	Linda Saenen, tel. 016 33 81 01

Adres

UZ Leuven campus Gasthuisberg
Herestraat 49
3000 Leuven



© januari 2010 UZ Leuven
Overname van deze tekst is enkel mogelijk na toestemming van de dienst
communicatie UZ Leuven.

Ontwerp en realisatie:
Deze tekst werd opgesteld door kindergeneeskunde in samenwerking met
de dienst communicatie.



Verantwoordelijke uitgever
UZ Leuven
Herestraat 49
3000 Leuven
Tel. 016 34 49 00
www.uzleuven.be

Het toedienen van Kalinox® bij je kind

Informatie voor ouders

700030

INLEIDING

Je kind moet een onderzoek ondergaan in UZ Leuven. Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder oppervlakkige analgesie en een matige sedatie. Dit wil zeggen dat je kind bij bewustzijn blijft en je ertegen kunt praten, maar dat je kind zelf weinig tot niets van de nadelen van het onderzoek ondervindt.

Het toedienen van Kalinox® heeft verschillende voordelen voor je kind:

- X Pijn en angst verminderen tijdens een medische/verpleegkundige handeling.
- X Voorkomen van het ontstaan van angstreacties voor herhaaldelijke medische/verpleegkundige handelingen.

Je arts, verpleegkundige of apotheker heeft je deze procedure voor het toedienen van Kalinox® waarschijnlijk al uitgelegd. Deze folder zet alle info nog eens op een rijtje.



Heb je nog vragen na het lezen van deze folder? Aarzel dan niet om je arts of verpleegkundige aan te spreken.

VOORBEREIDING

Voor de toediening van Kalinox® moet je kind niet nuchter zijn.

Wij leren je kind vooraf goed te blazen in het masker zodat de inhalatie automatisch volgt. Je kind zal voor de start van het onderzoek al drie à vijf minuten Kalinox® inademen, om te voorkomen dat je kind het onderzoek bewust beleeft.



PROCEDURE

Na drie minuten start de arts met het onderzoek bij je kind. Het inademen van de Kalinox® duurt tot het einde van het onderzoek. Tijdens de toediening kun jij of de verpleegkundige rustig praten met je kind en wordt je kind geobserveerd op eventuele tekenen van pijn. Dadelijk na de uitvoering van het onderzoek wordt de toediening van de Kalinox® gestopt en krijgt je kind ongeveer twee minuten zuurstof toegediend.

NAZORG EN OPVOLGING

De effecten van Kalinox® verdwijnen na ongeveer vijf minuten, we laten je kind dan niet alleen of we zorgen ervoor dat de hekken van zijn/haar bed toe zijn. Daarna laten we je kind even rechtop zitten alvorens rechtop te staan. Je kind mag onmiddellijk terug eten, zijn/haar activiteiten hervatten of naar huis gaan.

WAT KUN JE DOEN ALS OUDER

Als je dit wenst, mag je als ouder aanwezig zijn tijdens het onderzoek. Je aanwezigheid zorgt voor rust en jij weet hoe je kind het best kan worden afgeleid tijdens het onderzoek.

