



Besnijden door middel van een Plastibell bij kinderen

informatie voor patiënten

INLEIDING	3
WAT IS EEN BESNIJDENIS OF CIRCUMCISIE?	4
BESNIJDENIS MET EEN PLASTIBELL	5
WANNEER IS EEN BESNIJDENIS MET EEN PLASTIBELL WEL OF NIET AANGEWEEZEN?	5
Medische redenen	
Contra-indicaties	
EEN BESLISSING MAKEN	7
VOORBEREIDING OP DE INGREEP	7
HET DAGZIEKENHUIS CHIRURGIE	9
VERLOOP VAN DE INGREEP	9
Mogelijke complicaties	
NA DE INGREEP	12
Nazorg	
Opvolging	
KOSTPRIJS	13
CONTACTGEGEVENS	14
Via e-mail	
Via telefoon	

U als ouders hebt beslist om een besnijdenis door middel van een Plastibell te laten uitvoeren bij uw kind. Bij die ingreep wordt de voorhuid van de penis verwijderd door de kinderuroloog met behulp van een plastieken ringetje en een touwtje.

Hebt u na het lezen van deze brochure nog bijkomende vragen of twijfels? Aarzel dan niet om een arts of verpleegkundige uit ons team aan te spreken.

Wij wensen uw kind alvast een snel en goed herstel!

Het team van de dienst kinderurologie



WAT IS EEN BESNIJDENIS OF CIRCUMCISIE?

Bij een besnijdenis wordt de niet-elastische huid rond de glans van de penis verwijderd, zodat de glans of eikel van de penis zichtbaar wordt.

In UZ Leuven worden geen partiële besnijdenissen uitgevoerd, we verwijderen de voorhuid telkens volledig.

Een besnijdenis kan op twee manieren gebeuren:

- **Besnijdenis met een Plastibell.** Deze ingreep doen we bij kinderen tot de leeftijd van ongeveer 6 maanden. Meer info daarover vindt u verder in deze informatiebrochure.
- **Klassieke besnijdenis.** Deze ingreep doen we bij kinderen vanaf de leeftijd van 6 maanden onder algemene verdoving en een lokale verdoving. Meer info daarover vindt u in de informatiebrochure 'Besnijdenis bij kinderen'.



BESNIJDENIS MET EEN PLASTIBELL

Bij deze ingreep wordt de niet-elastische huid rond de penis verwijderd met behulp van een plastieken ringetje en een touwtje. Door het touwtje zal de overtollige huid afsterven en er dan vanzelf afvallen.

Bij **pasgeboren baby's tot en met 4 weken** oud gebeurt de ingreep onder lokale verdoving en suikerwater.

Bij **baby's van 3 tot 6 maanden** oud gebeurt de ingreep onder algemene verdoving.

WANNEER IS EEN BESNIJDENIS MET EEN PLASTIBELL WEL OF NIET AANGEWEEZEN?

MEDISCHE REDENEN

Behalve tradities en culturele gewoontes zijn er ook medische redenen om een besnijdenis uit te voeren op zeer jonge leeftijd. Zoals fimosis, een vernauwing van de voorhuid die infecties kan veroorzaken.

CONTRA-INDICATIES

In bepaalde gevallen is het beter om (nog) geen besnijdenis uit te voeren.



Bij pasgeboren baby's

De ingreep wordt beter uitgesteld wanneer:

- de baby nog niet voldoende vitamine K kreeg.
- de baby nog niet heeft kunnen plassen.
- de baby nog geen 24 uur oud is. Zo is er meer zekerheid dat de baby volledig stabiel en medisch in orde is.

Belang van vitamine K

Vitamine K is essentieel voor de bloedstolling. Een tekort aan vitamine K kan dan ook gevaarlijke bloedingen tot gevolg hebben.

In moedermelk zit maar een kleine hoeveelheid vitamine K, dus mama's kunnen dit tekort niet zelf oplossen via de voeding.

In sommige ziekenhuizen wordt bij de geboorte eenmalig intramusculair (via de spieren) vitamine K toegediend. In dat geval heeft de baby nadien geen extra vitamine K meer nodig.

In het geval dat de baby bij de geboorte enkel via de mond vitamine K toegediend kreeg en borstvoeding krijgt, bevelen we aan om 2 mg vitamine K per week toe te dienen tot de baby drie maanden oud is.

Bij kinderen met een aangeboren afwijking aan de penis

- hypospadie
 - Bij deze aangeboren afwijking ligt de opening van de plasbuis niet op de top van de eikel, maar komt die uit aan de onderkant van de eikel of ter hoogte van de schacht van de penis.
- kromming van de eikel
- oedeem of zwelling
- micropenis

EEN BESLISSING MAKEN

De beslissing maken om uw kind al dan niet te laten besnijden, kan moeilijk zijn voor u. Het is belangrijk om daarbij de voordelen en risico's van de procedure af te wegen.

Hebt u nog bedenkingen of vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de dienst urologie. De contactgegevens vindt u terug achteraan in deze informatiebrochure.

VOORBEREIDING OP DE INGREEP

Voor de ingreep komt u samen met uw kind op raadpleging bij de verpleegkundige en de kinderuroloog. Daar wordt het verloop van de ingreep met u besproken en gebeurt er een klinische controle van de penis van uw kind. Als u vragen zou hebben, kunt u die zeker ook stellen.

De ingreep zelf vindt niet plaats tijdens deze raadpleging.



Besnijdenis door middel van een Plastibell bij kinderen

HET DAGZIEKENHUIS CHIRURGIE

De **dag vóór de ingreep** contacteren wij u om het juiste tijdstip van de ingreep door te geven. Dan vertellen we u ook vanaf wanneer uw kind niet meer mag eten of drinken. Het is belangrijk dat uw kind **nuchter** is voor de ingreep.

Waarom moet mijn kind nuchter zijn voor de ingreep?

Tijdens de ingreep kan de maaginhoud overvloeien in de luchtweg. De beschermende mechanismen die dat normaal gezien voorkomen, worden onderdrukt door de toegediende medicatie die uw kind verdoven tijdens de ingreep. Als de maaginhoud in de longen zou terechtkomen, kan er zich een ernstige longontsteking ontwikkelen.

Is uw kind niet nuchter bij het aanmelden? Dan is het mogelijk dat de ingreep moet uitgesteld of geannuleerd worden.

Op de **dag van de ingreep** meldt u zich met uw kind aan in het dagziekenhuis chirurgie A (E 596) op campus Gasthuisberg.

Als u met de auto komt, parkeert u het best op parking Oost aan rotonde Het Teken. Op de kiss-and-ridezone (K+R) van het dagziekenhuis chirurgie kunt u de auto slechts korte tijd (max. 45 minuten) parkeren om iemand te brengen of op te halen.

U bereikt het dagziekenhuis via de algemene ontvangsthal (toegang Oost). Dan gaat u naar de **oranje straat, poort 6, niveau -1**.

Voorschriften en attesten

Check vooraf welke attesten de uroloog moet invullen, bijvoorbeeld documenten voor het ziekenfonds. Vraag bij het aanmelden op de dag van de ingreep of de arts deze documenten wil invullen.

VERLOOP VAN DE INGREEP


Als uw kind geopereerd wordt onder volledige verdoving (leeftijd van 3 tot 6 maanden) mag één ouder of voogd het kind mee begeleiden tot hij slaapt. Dat is niet toegelaten als uw kind enkel lokaal verdoofd wordt. Dan zal een verpleegkundige van het operatiekwartier uw kind ophalen en weer terugbrengen.

Bij een volledige verdoving krijgt uw kind ook een waakinfuus, dat wordt geprikt terwijl hij slaapt en dat na de ingreep nog even zal blijven.

Eerst wordt de huid goed ontsmet om infectie te voorkomen. Daarna wordt er een lokale verdoving toegediend rond de penis of rond de zenuwen van de penis om de pijn te verminderen. Doorgaans werken de verdovingsmiddelen tot 4 à 5 uur na de ingreep.



Een plasticen ringetje (Plastibell) wordt tussen de eikel van de penis en de voorhuid geplaatst. Dan wordt een steriel draadje stevig rond de voorhuid geknoopt in een smalle groeve in de basis van de Plastibell, duwend op de voorhuid.



De niet-elastische huid wordt vervolgens afgeknipt en de overige huid zal eraf vallen doordat de Plastibell even ter plaatse blijft. Het plasticen ringetje valt er na één tot twee weken ook vanzelf af of zal worden doorgeknipt door de arts op de controleraadpleging.

De verdoving en de ingreep duren samen ongeveer 15 tot 20 minuten.

MOGELIJKE COMPLICATIES

Elke medische behandeling brengt risico's en mogelijke complicaties met zich mee. Dat werd ook met u besproken tijdens de raadpleging. Hebt u nog vragen of twijfels? Aarzel dan zeker niet om meer uitleg te vragen aan de arts of verpleegkundige.

Als u vermoedt dat er een probleem is, kom dan onmiddellijk met uw kind naar de spoedgevallendienst. Bij niet-dringende vragen kunt

u enkele foto's nemen en die samen met uw vraag via e-mail bezorgen aan urologie@uzleuven.be. Daarop probeert de arts of verpleegkundige dan zo snel mogelijk te antwoorden.

De volgende complicaties kunnen voorkomen na de ingreep:

- **Pijn bij het plassen**

Vooraf de eerste keren na de ingreep. Deze pijn gaat spontaan weer weg.

- **Infectie en/of koorts**

Een wonde kan steeds ontsteken, maar bij deze ingreep is dat eerder zeldzaam. Als er toch een infectie optreedt of uw kind koorts heeft, neem dan zeker contact op met de behandelende arts.

- **Nabloeding**

Het is mogelijk dat de wonde nog een beetje bloedt na de ingreep. Meestal stopt de bloeding vanzelf, maar soms ook niet. In dat geval moet u zelf de bloeding afduwen. Als de bloeding dan nog niet stopt, komt u naar het ziekenhuis.

- **Zwelling**

Na ongeveer vijf dagen is de zwelling het meest uitgesproken. Pas daarna neemt de zwelling weer af en kan het plastieken ringetje eraf vallen. Maak u geen zorgen als het ringetje er na één tot twee weken nog niet volledig afviel, dan wordt het op de controleraadpleging vlot en pijnloos verwijderd. U hoeft zeker niet aan het ringetje te trekken om het er zelf af te halen.

- **Chirurgische schade**

De chirurgen werken zo precies en voorzichtig mogelijk, maar het is altijd mogelijk dat de eikel van de penis licht beschadigd wordt. Er kan ook littekenvorming optreden.



NA DE INGREEP

Als de ingreep onder volledige verdoving werd uitgevoerd, mag uw kind naar huis zodra hij een eerste keer heeft kunnen plassen. Het waakinuus wordt na de ingreep verwijderd.

NAZORG

Er wordt **geen verband** aangebracht. Uw kind mag zowel douchen als in bad gaan. De penis mag normaal verzorgd worden zoals anders, met eventueel een druppel babyolie wanneer uw kind in bad of in de douche gaat.

We raden aan om ook bij elke **luierswissel** een paar druppels babyolie in het midden van het plastieken ringetje te druppelen, om te voorkomen dat het slijmvlies uitdroogt. Ook als het ringetje er is afgevallen, mag u dat nog enkele weken doen.

OPVOLGING

Op de dag van de ingreep krijgt u meteen een afspraak om **twee weken later** opnieuw naar de raadpleging urologie te komen. De behandelende arts zal de wonde dan controleren.

Ook als de wonde al goed genezen lijkt te zijn, raden we u toch aan om zeker met uw kind naar de raadpleging te komen.

KOSTPRIJS

Op de website van UZ Leuven vindt u meer info over de geschatte kostprijs naargelang uw verzekering. Surf naar www.uzleuven.be/nl/kostenraming/besnijdenis-circumcisio of scan de QR-code.



CONTACTGEGEVENS

U kunt steeds contact opnemen met de dienst urologie van UZ Leuven.

VIA E-MAIL

- urologie@uzleuven.be
- Gebruik e-mail als u een niet-dringende vraag hebt en eventueel foto's wil meesturen. Graag vermelden: 't.a.v. kinderurologie' en de geboortedatum en naam of het kenmerknummer van uw kind.

VIA TELEFOON

- Voor medische problemen na de ingreep:
 - verpleegkundig consulent urologie-pediatrie Jolien Delestinne
tel. 016 34 60 46
- Voor het maken van een afspraak:
 - secretariaat urologie
tel. 016 34 66 85

Kom bij dringende problemen steeds zo snel mogelijk naar de spoedgevallendienst.



© oktober 2022 UZ Leuven

Overname van deze tekst en illustraties is enkel mogelijk na toestemming van de dienst communicatie UZ Leuven.

Ontwerp en realisatie

Deze tekst werd opgesteld door de dienst urologie in samenwerking met de dienst communicatie.

U vindt deze brochure ook op www.uzleuven.be/brochure/701525.

Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kunt u bezorgen via communicatie@uzleuven.be.

Verantwoordelijke uitgever
UZ Leuven
Herestraat 49
3000 Leuven
tel. 016 33 22 11
www.uzleuven.be

 mynexuzhealth



Raadpleeg uw medisch dossier
via nexushealth.com
of download de app

