

Je therapie: binimetinib (Mektovi[®]) - encorafenib (Braftovi[®]) (AMO)



DEZE BIJLAGE HOORT BIJ DE GIDS 'JE ONCOLOGISCHE BEHANDELING MET TABLETTEN OF CAPSULES'.

WAT IS DE SAMENSTELLING VAN DEZE THERAPIE?

De therapie bestaat uit twee celremmende geneesmiddelen (doelgerichte therapie), namelijk binimetinib en encorafenib. Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Die dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om de bijwerkingen te beperken.

HOE VERLOOPT DE THERAPIE?

- Je komt naar de raadpleging of het dagziekenhuis voor een bloedafname, een klinisch onderzoek en een voorraad tabletten. Je neemt de tabletten en capsules dan thuis in.
- Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. **Eén cyclus duurt 4 weken (28 dagen). Binimetinib (Mektovi[®]) en encorafenib (Braftovi[®]) worden dagelijks ingenomen.**
- Binimetinib bestaat in tabletten van 15 mg. Encorafenib bestaat in capsules van 50 mg en 75 mg. Je arts of verpleegkundige vertelt je welke dosis je dagelijks moet nemen. Afhankelijk van de ernst van de nevenwerkingen die je ondervindt, is een dosisverlaging mogelijk.

Binimetinib (Mektovi [®]) 2 x per dag Encorafenib (Braftovi [®]) 1 x per dag			Week 1	Week 2	Week 3	Week 4
's morgens mg binimetinib	 of 	✓	✓	✓	✓
 mg encorafenib		✓	✓	✓	✓
's avonds mg binimetinib		✓	✓	✓	✓

Inname

- Binimetinib wordt **twee keer per dag** ingenomen met **12 uur tussen beide innames**.
- Encorafenib wordt **één keer per dag** ingenomen **bij voorkeur 's morgens**.
- Binimetinib en encorafenib worden systematisch **op een lege maag of bij de maaltijd** ingenomen.
- Binimetinib en encorafenib mogen tegelijkertijd ingenomen worden.
- **Interactie met voeding:** vermijd tijdens de inname van binimetinib het eten of drinken van pompoes(sap) of preparaten op basis van sint-janskruid.

Wat als?

Als je een dosis **binimetinib** bent vergeten, kan je **de vergeten dosis inhalen tot 6 uur vóór de volgende dosis**. Wanneer er minder dan 6 uur is vóór de volgende dosis, sla je de vergeten dosis over en neem je volgende dosis op het geplande tijdstip.

Als je een dosis **encorafenib** bent vergeten, kan je **de vergeten dosis inhalen tot 12 uur vóór de volgende dosis**. Wanneer er minder dan 12 uur is vóór de volgende dosis, sla je de vergeten dosis over en neem je volgende dosis op het geplande tijdstip.

Algemene richtlijnen rond de inname, bewaring en manipulatie en wat je het best doet als zich bepaalde situaties voordoen, kan je vinden in de gids 'je oncologische behandeling met tabletten of capsules'.

AANDACHTSPUNTEN BIJ BINIMETINIB EN ENCORAFENIB

- Door de inname van binimetinib en encorafenib is je huid heel gevoelig voor zonlicht en kan je snel verbranden. Bescherm je tegen zonlicht en probeer zoveel mogelijk direct en indirect zonlicht te vermijden.
- Door de inname van binimetinib en encorafenib kan het gebeuren dat je last hebt van koorts, hoofd-, spier- en gewrichtspijn. Daarvoor mag je 1 gram paracetamol tot maximaal 4 keer per dag innemen. Controleer daarom regelmatig je lichaamstemperatuur.
- Het kan gebeuren dat je door de inname van binimetinib vocht opstapelt. Daardoor kan je gewicht toenemen.
- Soms krijg je door de inname van deze medicijnen last van wazig zicht, droge of rode ogen of een ontsteking aan de ogen. Neem contact op met je behandelende arts als je dit ervaart.
- Deze medicijnen kunnen mogelijk een invloed hebben op je hartfunctie. Neem contact op met je behandelende arts als je pijn op de borstkas, hartkloppingen of kortademigheid ervaart.

NEVENWERKINGEN VOORKOMEN (zie brochure)

Bescherm jezelf tegen een aantal nevenwerkingen door:



Infecties voorkomen



Mondhygiëne en
mondspoeling



Huidverzorging



Wondjes voorkomen



Rust en beweging



Voorgeschreven
medicatie innemen



Voldoende drinken

Bij jouw behandeling zijn ook de volgende adviezen belangrijk om nevenwerkingen te voorkomen:



Bloeddruk meten



Hand- en
voetverzorging



Nagelbescherming

MOGELIJKE NEVENWERKINGEN AANPAKKEN (zie brochure)

Bij jouw behandeling kunnen zich de volgende nevenwerkingen of klachten voordoen:

- Buikloop of diarree
- Huidveranderingen zoals:
 - Droge huid, schilfering, jeuk, huiduitslag
 - Huiduitslag in de vorm van puistjes
 - Huidveranderingen aan de handpalmen en voetzolen
- Misselijkheid en braken
- Smaak- en reukveranderingen
- ~~Mondslimvliesontsteking (afters)~~
- ~~Een verminderd aantal witte bloedcellen~~
- ~~Een verminderd aantal rode bloedcellen~~
- ~~Een verminderd aantal bloedplaatjes~~
- ~~Haarveranderingen~~
- ~~Nagelveranderingen~~
- ~~Verstopping~~
- ~~Verhoogde bloeddruk~~
- Tintelingen en voos gevoel
- Spier- en gewrichtspijn
- Ongewone vermoeidheid
- Gevoelens van angst, boosheid en verdriet
- Invloed op de seksualiteit

