



Overzicht klinische studies Hepatologie

Open voor inclusie

ACLF

- **UNVEIL-IT** : Een open-label, gerandomiseerde, gecontroleerde, multicentrische, proof-of-concept, fase 2a-studie, om de werkzaamheid, veiligheid en verdraagbaarheid van VS-01 samen met standaardzorg te beoordelen, in vergelijking met de standaardzorg alleen, bij volwassen patiënten met acute insufficiëntie op chronisch leverfalen (ACLF) graad 1-2 en ascites.

ALFA-I ANTITRYPSINE DEFICIËNTIE

- **Register** : Onderzoek van leverziekten bij patiënten met Alpha-I Antitrypsine Deficiëntie.
- **TAK-999-3001**: Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase 3-studie om de werkzaamheid en veiligheid van fazirsiran te evalueren bij de behandeling van leverziekte geassocieerd met alfa-I antitrypsinedeficiëntie met een METAVIR-fibrosescore van stadium F2 tot F4.

CIRROSE EN COMPLICATIES VAN CIRROSE

- **PEARL**: Preventie van hepatische encefalopathie door toediening van Rifaximine en Lactulose voor en na Transjugulaire intrahepatische portosystemische shunt (TIPS) plaatsing.
- **ALB-trial**: Een gerandomiseerde, dubbelblinde en placebo-gecontroleerde studie naar het effect van humaan albumine-toedieningen in de behandeling van patiënten met gedecompenseerde cirrose op geleide van de MICROB-PREDICT biomarker.
- Echoendoscopisch begeleide respons beoordeling van niet-selectieve beta-blokkers in de behandeling van klinisch significante portale hypertensie

GASTRIC OUTLET OBSTRUCTIE (GOO) BIJ MALIGNITEIT

- **EATING**: Een multicentrische cohort studie en gerandomiseerd gecontroleerde trial ter vergelijking van echo-endoscopie(EUS)-geleide versus laparoscopische gastrojejunostomie bij patiënten met kanker-gerelateerde gastric outlet obstructie.

MASLD

- **NATIV3**: Een gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd, fase 3-onderzoek in meerdere centra ter beoordeling van de werkzaamheid en veiligheid van lanifibranor gevolgd door een verlenging van de actieve behandeling bij volwassen patiënten met niet-cirrotische niet-alcoholische steatohepatitis (NASH) en leverfibrose in fibrose 2 (F2)/fibrose 3 (F3) stadium.
- **MK-6024-013**: Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase 2b-studie in meerdere studiecentra naar de werkzaamheid en veiligheid van efinopegdutide (MK-6024) bij volwassenen met precirrotische niet-alcoholische steatohepatitis.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met ons studieteam:

natalie.vandenende@uzleuven.be / tine.vrancken@uzleuven.be / petra.windmolders@uzleuven.be