

Eliquis[®] 2,5/5 mg (apixaban)

MEDICATIE BIJ VOORKAMERFIBRILLATIE (VKF)



- ✓ Eliquis[®] verdunt het bloed en verkleint het risico op het ontstaan van bloedklonters als gevolg van een hartritme-stoornis (voorkamerfibrillatie = VKF).
- ✓ Eliquis[®] moet meestal levenslang ingenomen worden. Vraag de duur van uw behandeling altijd na bij uw arts.
Stop nooit op eigen initiatief.
- ✓ Eliquis[®] wordt 2 keer per dag ingenomen. Bij voorkeur 's ochtends en 's avonds, maar zeker elke dag op hetzelfde tijdstip.
- ✓ **Sla geen dosis over.**
Geen medicatie innemen = geen bescherming.
- ✓ Dit geneesmiddel kan met of zonder voedsel ingenomen worden. Tabletten mogen geplet worden als slikken moeilijk is.

- ✓ Als u een dosis vergeet, moet u deze binnen de 6 uur na de geplande inname innemen. **Neem nooit een dubbele dosis.**
- ✓ Een bloeding is de meest voorkomende bijwerking van een bloedverdunner. Het vermijden van een bloedklonter is echter meestal veel belangrijker dan het bloedingsrisico. Raadpleeg uw arts als u tekenen vertoont van bloedingen, zoals:

- ongewone blauwe plekken, neusbloedingen, bloeding van het tandvlees, snijwonden die langdurig bloeden
- bloederige fluïmen of bloed braken
- rode of zwarte stoelgang, bloed in de stoelgang
- bloed in de urine
- duizeligheid, bleekheid of zwakte

- ✓ Start nooit met een ander geneesmiddel zonder uw arts te raadplegen, zelfs geen pijnstiller zonder voorschrift.
- ✓ Vermeld bij een bezoek aan de (huis)arts, apotheker, tandarts of in het ziekenhuis altijd dat u een bloedverdunner neemt.