

## Hoger risico op anafylaxie bij COVID-19 vaccinatie?

Task force indicaties in-hospitaal vaccinatie (in de context van anafylaxie risico):

1. Mastocytose
2. Idiopatische anafylaxie
3. Hereditair angio-oedeem

Pro-actieve oproeping via contact center UZL

016/344775

Bijkomende patiënten via huisarts?

Vaccinatie en registratie in gecontroleerde setting (UZL/Netwerk ZKH)

Onmiddellijke allergische reacties na vroegere vaccinatie(s)?

Bijkomende informatie (via patiënt, huisarts, apotheker): "merk", "jaartal", "reactie"

Overleg met allergoloog en/of verwijzing (raadpleging).

- UZ Leuven: Prof Dr. R. Schrijvers, Prof. Dr. C. Breynaert, (via contact center 016/344775)
- H Hart : Dr. Verniest, Dr. De Maeyer, Dr Desie
- RZ Tienen: Dr. A. Peeters
- AZ Diest

nee<sup>§</sup>

Was de index reactie compatibel met een onmiddellijke allergische reactie (anafylaxie\*)?

ja

ja

Werd een vermijdbare oorzaak geïdentificeerd? (bv latex allergie, andere verklaring)?

nee

nee

Bevatte het vaccin polysorbaat<sup>§</sup>?

ja of ik weet het niet

ja

Was er nadien nog probleemloze toediening van polysorbaat<sup>§</sup>?

nee

Vaccinatie in vaccinatiecentrum

Geen indicatie, herverwijzing naar huisarts.

Bezorg:

- 1) Verwijsinfo
- 2) Inge vulde vragenlijst
- 3) Contactgegevens patiënt

### § Producten die polysorbaat 80 bevatten (niet-limitatief):

Alfa-RIX-tetra (2020-2021), Havrix, Gardasil, Prevenar13, Revaxis, Triaxis-polio, Boostrix-Polio, Imovax-Polio

Diprophos

Xgeva, Taxotere, Ecalta

Lantus/Apidra/Trulicity

Neulasta

Cordarone ampule (IV)

De meeste monoclonale antilichamen (bv Mabthera, Remicade)

- Gekende allergie voor PEG/polysorbaat maar duidelijke indicatie COVID-19 vaccinatie.
- Mogelijk allergie op macrogol (na colonoscopie voorbereiding bv)
- Mogelijke allergie na DepoMedrol (zie \*)

§ Bij twijfel of ernstige andere reactie: overleg.

### \* Wat is een anafylaxie en wat niet?

[https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/7\\_Injectie\\_vaccin\\_anafylaxie\\_versie\\_DrLecoutere.pdf](https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/7_Injectie_vaccin_anafylaxie_versie_DrLecoutere.pdf)

Een ernstige allergische reactie beantwoordt aan **alle** volgende kenmerken:

- o Reactie die optreedt **binnen het uur** na blootstelling aan het allergeen
- o Waarbij gebruik dient gemaakt te worden van **noodmedicatie** (adrenaline, antihistaminica, steroïden) of dringende medische hulp
- o **Kortdurend** is (aanwezigheid symptomen <24u)
- o Presentatie met **minstens twee** van volgende symptomen:
  - o Urticaria - jeukende huidreactie of slijmvlieszwelling (in 80-90%)
  - o Hemodynamische veranderingen (syncope, bloeddrukdaling, incontinentie)
  - o Respiratoire weerslag (wheezing, stridor, dyspnoe)
  - o Krampen, braken