

# Je therapie: imatinib

DEZE BIJLAGE HOORT BIJ DE GIDS 'JE ONCOLOGISCHE BEHANDELING MET TABLETTEN OF CAPSULES'.

## WAT IS DE SAMENSTELLING VAN DEZE THERAPIE?

De therapie bestaat uit één celremmend geneesmiddel (doelgerichte therapie), namelijk imatinib. Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Die dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om de bijwerkingen te beperken.

## HOE VERLOOPT DE THERAPIE?

- Je komt naar de raadpleging of het dagziekenhuis voor een bloedafname, een klinisch onderzoek en een voorraad capsules. Je neemt de tabletten of capsules dan thuis in.
- Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. **Eén cyclus duurt 4 weken (28 dagen). Imatinib wordt dagelijks ingenomen.**
- Imatinib bestaat in tabletten of capsules van 100 mg en 400 mg. Je arts of verpleegkundige vertelt je welke dosis je dagelijks moet nemen. Afhankelijk van de ernst van de nevenwerkingen die je ondervindt, is een dosisverlaging mogelijk.

Imatinib		Week 1	Week 2	Week 3	Week 4
..... mg 1x per dag		✓	✓	✓	✓

## Inname

- Imatinib wordt meestal **één keer per dag ingenomen**. Afhankelijk van de dosis is het mogelijk dat je arts je voorstelt om imatinib in twee giften in te nemen, namelijk 's ochtends en 's avonds.
- Imatinib wordt **bij de maaltijd ingenomen**.
- **Interactie met voeding:** tijdens de inname imatinib vermijd je het eten of drinken van pompel-moes(sap) of preparaten op basis van sint-janskruid.

## Wat als?

Als je een dosis imatinib bent vergeten, sla dan **de vergeten dosis over**. Neem je volgende dosis op het geplande tijdstip.

**Algemene richtlijnen rond de inname, bewaring en manipulatie en wat je het best doet als zich bepaalde situaties voordoen, kan je vinden in de gids 'je oncologische behandeling met tabletten of capsules'.**

## AANDACHTSPUNTEN BIJ IMATINIB

- Door imatinib kan je last krijgen van hoofdpijn, spierpijn en gewrichtspijn. Als je veel last hebt van pijn mag je tot 3 maal per dag 1 gram paracetamol innemen. Meet best eerst je lichaamstemperatuur om na te gaan of je geen koorts hebt.
- Door de inname van imatinib is je huid heel gevoelig voor zonlicht en kan je daardoor sneller verbranden. Bescherm je daarom tegen zonlicht en probeer direct en indirect zonlicht zoveel mogelijk te vermijden.
- Door de inname van imatinib kan het zijn dat je vocht opstapelt. Daardoor kan je gewicht toenemen. Controleer daarom regelmatig je gewicht.
- Mogelijk heeft imatinib een invloed hebben op het vetgehalte (cholesterol) in je bloed en daardoor op je bloedvaten. Je zal daarom op regelmatige tijdstippen een bloedafname krijgen om het cholesterolgehalte in je bloed op te volgen. Probeer ook tweemaal per week je bloeddruk en je gewicht op te volgen.



## NEVENWERKINGEN VOORKOMEN (zie brochure)

Bescherm jezelf tegen een aantal nevenwerkingen door:



Infecties voorkomen



Mondhygiëne en mondspoeling



Huidverzorging



Wondjes voorkomen



Rust en beweging



Voorgeschreven medicatie innemen



Voldoende drinken

Bij jouw behandeling zijn ook de volgende adviezen belangrijk om nevenwerkingen te voorkomen:



Bloeddruk meten



Hand- en voetverzorging



Nagelbescherming

## MOGELIJKE NEVENWERKINGEN AANPAKKEN (zie brochure)

Bij jouw behandeling kunnen zich de volgende nevenwerkingen of klachten voordoen:

- Buikloop of diarree
- Huidveranderingen zoals:
  - Droge huid, schilfering, jeuk, huiduitslag
  - ~~Huiduitslag in de vorm van puistjes~~
  - ~~Huidveranderingen aan de handpalmen en voetzolen~~
- Misselijkheid en braken
- Smaak- en reukveranderingen
- ~~Mondslimvliesontsteking (afters)~~
- Ongewone vermoeidheid
- Gevoelens van angst, boosheid en verdriet
- Invloed op de seksualiteit
- Een verminderd aantal witte bloedcellen
- Een verminderd aantal rode bloedcellen
- Een verminderd aantal bloedplaatjes
- ~~Haarveranderingen~~
- ~~Nagelveranderingen~~
- ~~Verstopping~~
- Verhoogde bloeddruk (*door verhoogd cholesterol*)
- ~~Tintelingen en voos gevoel~~
- Spier- en gewrichtspijn

