



Entretien d'un cathéter à chambre implantable

Information destinée aux patients et le personnel infirmier des soins à domicile

Rincez le cathéter tous les trois mois avec une solution saline physiologique (NaCl 0,9%) en cas de non-utilisation prolongée.

RINÇAGE TRIMESTRIEL

Procédure (info pour les soins à domicile) :

Une aiguille de Huber est introduite dans la chambre. On utilise habituellement une aiguille sécurisée d'un diamètre de 20G. La longueur de l'aiguille peut varier en fonction de l'épaisseur du tissu sous-cutané (habituellement une aiguille de type Surecan® de 15 mm de long).



- Désinfectez vos mains (propres) au gel hydroalcoolique.
- Mettez des gants anti-germes.
- Palpez la peau au-dessus de la chambre pour bien repérer l'endroit où il faut piquer.
- Avant de piquer, désinfectez la peau en frictionnant pendant 15 secondes avec une solution de chlorhexidine dans l'alcool (de préférence chlorhexidine 2% dans l'alcool).
- Pendant que le produit désinfectant sèche, vous pouvez purger l'aiguille de Huber avec une seringue de 10 ml NaCl 0,9%.
- Maintenez la chambre entre le pouce et l'index, sans toucher l'endroit de la piqûre (technique « no touch »).
- Insérez l'aiguille perpendiculairement dans la chambre. Veillez à ce que l'aiguille aille bien au fond de la chambre.
- Vérifiez si l'aspiration de sang est possible (arrivée de sang dans la tubulure, évitez d'aspirer le sang jusque dans la seringue)
- Rincez ensuite la chambre et le cathéter à l'aide d'une injection pulsée de 10 ml* de NaCl 0,9%. « Verrouillez » la chambre sous pression positive càd. Fermer le clamp de la tubulure pendant l'injection lente des 3 derniers millilitres de liquide.
- Après avoir enlevé l'aiguille, couvrez immédiatement le trou de l'aiguille avec un pansement absorbant stérile.

* 5 ml pour un nourrisson ou un enfant de moins de 10 kg (injections toujours à l'aide d'une seringue de 10ml).

Longueurs d'aiguille disponibles :

- Surecan® Safety : 12 mm – 15 mm – 20 mm – 25 mm

POINTS À SURVEILLER

POUR SOIGNANTS ET PATIENTS DANS LES SOINS À DOMICILE

- X Le cathéter à chambre implantable peut être rincé par un infirmier à domicile (indépendant ou via une organisation) ou par le médecin généraliste. Ils ont l'équipement nécessaire pour effectuer ce soin.
- X Pensez à demander une prescription pour le rinçage de la chambre (tous les trois mois) au médecin qui vous soigne à l'hôpital.

CONTACT

En cas de problème avec avec la chambre implantable (p. ex. problème de ponction ou rinçage impossible ou difficile) ou pour des informations complémentaires, veuillez prendre contact pendant les heures de bureau avec :

- Les infirmiers de l'équipe de référence soins de cathéter intraveineux, tél. 016 34 08 64 (08h30 - 16h00), katheterzorg@uzleuven.be
- Le secrétariat de chirurgie oncologique, tél. 016 34 68 32 ou 016 34 68 31 ou 016 34 68 29

© Juin 2020 UZ Leuven

Ce texte et ses illustrations ne peuvent être reproduits qu'avec l'accord du service Communication de l'UZ Leuven.

Conception et réalisation

Ce texte a été préparé par les infirmiers et les médecins de l'équipe de référence soins de cathéter intraveineux en collaboration avec le service d'hygiène hospitalière et le service Communication.

Cette brochure peut également être consultée sur www.uzleuven.be/fr/brochure/700604.

Les remarques ou suggestions concernant cette brochure peuvent être adressées à communicatie@uzleuven.be.

Éditeur responsable
UZ Leuven
Herestraat 49
3000 Louvain
tél. 016 33 22 11
www.uzleuven.be

 mynexuzhealth



Consultez votre dossier médical
sur www.mynexuzhealth.be ou

